

# Manejo completo de un caso de rabia

## Cuando se debe sospechar de un incidente de contacto o agresión animal-persona que puede tratarse de rabia

Puede ocurrir una agresión en lo cual una persona es atacada por un animal de forma espontanea o provocada

- perro
- gato
- Animal silvestre
- Con animales de interés económico

Las estadísticas por mordedura indican que la mayoría son por perros

Realizar un interrogatorio para entender como ocurrió el incidente

- si ocurrió en la casa
- Si ocurrió en la calle

Es probable de que tenga dueño y se disponga de una información del sobre la salud del perro o de su estado vacunal

Se deberá localizar al perro al perro agresor para identificarlo

## Atención medica inmediata de la persona expuesta

Considerar dos situaciones

La primera es la exposición por contacto

Únicamente se realiza lavado de la región afectada con solución antiséptica o jabón y agua a chorro

Exposición por agresión

- Valorar el cierre quirúrgico de la herida
- Evaluarse si es necesario aplicar la inmunoglobulina antirrábica humana, en caso de ser afirmativo se infiltrara en la herida previo al procedimiento
- Aplicar toxoide tetánico

Evaluar si el paciente continua en esa unidad medica o bien ser referido a un segundo o tercer nivel

Cuando se presente una herida que ponga en peligro su integridad

Cuando la unida carece de medicamentos y material de curación

Cuando el paciente tiene antecedentes de inmunodeficiencia

## Como será el esquema de vacunación antirrábica humana para aplicarse

Exposición sin riesgo

No hay contacto directo con la saliva del animal o cuando la persona sufrió lamedura en la piel intacta y no hay lesión

No esta indicado aplicar los biológicos antirrábicos humanos

Exposición de riesgo leve

Comprende dos posibles situaciones

Cuando la persona sufrió lamedura en piel erosionada o en herida reciente

Considera en la persona una mordedura superficial

5 dosis retribuidas los días 0, 3, 7, 14, y 28 o 30 tomando como día 0 cuando se aplique la primera dosis

Vía de administración: exclusivamente en la región deltoidea en adultos y en la región antero lateral del muslo en niños menores de un año.

Exposición de riesgo grave

Simultanea ala atención primaria de la herida, se aplicara la inmunoglobulina y la vacuna antirrábica humana

La inmunoglobulina antirrábica humana se indicara aplicarla de preferencia coincidir el mismo día que se aplique la primera dosis de vacuna antirrábica humana

Universidad del sureste Medicina humana

Docente: Dr. Mónica

Semestre: 2

Materia: salud publica 2

Tema: esquema

Alumno: Marvin López Roblero