

***UNIVERSIDAD DEL SURESTE***

***Medicina Humana***

***Dra. Mónica Gordillo Rendón***

***Yereni Monserrat Perez Nuricumbo***

***2grado***  
**Salud Publica II**

***24-04-2023***

***A***

***28-04-2023***



4 a 12 semanas Todo el tiempo que expulsan esputo BTV.

Periodo de contagio

Periodo de incubación es de 2 a 12 semanas



Mycobacterium tuberculosis (Bacilo de Koch)



¿Dónde se encuentran?




transmisible enfermedad crónica

causada por

# Tuberculosis

Se transmite por

exposición al bacilo



Mycobacterium bovis La TBC bovina se da por

Exposición al ganado tuberculoso,



Afecta principalmente



Diagnostico

Debilidad

Febrícula (38 a 38°C)

Tos con sangre (hemoptisis)

Anorexia

Escalofríos

Astenia

Adelgazamiento

tos seca+15días



# Bibliografía

*centro para el control y para la prevencion de enfermedades* . (3 de mayo de 2022). Obtenido de

<https://www.cdc.gov/tb/esp/topic/basics/signsandsymptoms.htm>

*GPC.* (s.f.). Obtenido de

<https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/070GER.pdf>

*IMSS.* (s.f.). Obtenido de <http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/infografias/tuberculosis>

*medline plus.* (12 de agosto de 2022). Obtenido de

<https://medlineplus.gov/spanish/tuberculosis.html>

*organización mundial de la salud* . (14 de oct de 2021). Obtenido de

<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis>