



FARMACOLOGIA

EFFECTOS SECUNDARIOS DE LAS FAMILIAS DE FARMACOS

DOCENTE:

Dr. Manuel Eduardo Gomez Lopez

ALUMNA:

Ingrid Renata Lopez Fino

MEDICINA HUMANA

IV SEMESTRE

UNIDAD II

PRINCIPALES EFECTOS SECUNDARIOS

ANESTESICOS LOCALES



El paciente puede experimentar mareo, náuseas, vómitos, hipotensión, hiperventilación o más frecuentemente síncope vasovagal (hipotensión, bradicardia, palidez) convulsiones y coma.

ANALGESICOS OPIACEOS



Los opioides pueden causar efectos secundarios como somnolencia, niebla mental, náuseas y estreñimiento, respiración lenta, lo que puede conducir a muertes por sobredosis.

ANSIOLITICOS



Pueden causar adicción física, adicción psicológica, crean tolerancia y pueden debilitarse.

NEUROLEPTICOS



Aumento de peso, mareos, hipotensión postural, síntomas extrapiramidales y discinesia tardía tras el tratamiento prolongado. Hiperglucemia y diabetes.

ANTIDEPRESIVOS



Náusea y vómitos, aumento de peso, diarrea, somnolencia, problemas sexuales, como falta de deseo o capacidad para tener relaciones sexuales



RELAJANTES MUSCULARES



Sedación, mareos, somnolencia, vómitos, descoordinación de los brazos, confusión, pérdida de reflejos y visión borrosa.



BIBLIOGRAFIA

<https://medlineplus.gov/spanish/opioidmisuseandaddiction.html#:~:text=Los%20opioides%20pueden%20causar%20efectos,conducir%20a%20muertes%20por%20sobredosis.>

<https://www.parkinsonysalud.com/los-riesgos-de-tomar-ansioliticos-y-sus-efectos-secundarios/>

https://www.samfyc.es/wp-content/uploads/2018/10/v19n1_09_repasaFarmacos.pdf

<https://medlineplus.gov/spanish/antidepressants.html>

https://www.sabervivirtv.com/medicina-general/tomar-relajantes-musculares_269