



Nombre del Alumno: Andrea Citlali Maza López

Nombre del tema: Retención e incontinencia urinaria

Parcial: tercero

Nombre de la Materia: medicina paliativa

Nombre del profesor: Horacio Muñoz Guillen

Nombre de la Licenciatura: medicina humana

sexto semestre

San Cristóbal de las casas, Chiapas, 1 de junio del 2023

Incontinencia urinaria

Pérdida involuntaria de orina a través de la uretra, que es objetivamente demostrable y cuya cantidad o frecuencia constituye un problema higiénico, social y de salud.

Puede variar desde una fuga ocasional hasta la incapacidad total para retener cualquier cantidad de orina.

Clasificación

De esfuerzo

refiere a la pérdida involuntaria de orina seguido al aumento de la presión intraabdominal en ausencia de contracción del detrusor.

Con urgencia

Incontinencia debida a contracciones involuntarias del detrusor durante la fase de llenado, y que pudiese ser espontánea o provocada, es acompañada o inmediatamente precedida por urgencia que es el deseo súbito e inminente de expulsar orina y difícil de dominar.

Por rebosamiento

Se caracteriza por la obstrucción mecánica de la uretra o imposibilidad para la contracción del detrusor evitando la micción normal.

Causas

Infecciones del tracto urinario, Vaginitis o uretritis atrófica, Impactación fecal, Efectos secundarios de medicamentos, Causas metabólicas, Exceso en la ingesta de líquidos, Insuficiencia venosa con edema, Insuficiencia cardíaca, Epilepsia y/o convulsiones secundarias y Delirium.

Tratamiento

Ejercicios de Kegel, fármacos como la oxibutina y la tolterodina, además de la cirugía

retención urinaria

La retención urinaria es una afección por la cual una persona no puede vaciar toda la orina de su vejiga.

La retención urinaria puede ser aguda, es decir, una incapacidad repentina para orinar, o crónica, una incapacidad gradual para vaciar completamente la vejiga de la orina.

Síntomas y causas

incapacidad de orinar dolor, a menudo fuerte, en la parte inferior del abdomen
necesidad urgente de orinar hinchazón en la parte inferior del abdomen

Diagnostico

Historia clínica
Examen físico
Medición de la orina posmiccional residual
Pruebas de laboratorio
Pruebas de diagnostico por imagen como ecografía, resonancia magnética y TAC

tratamiento

Sondeo uretral y tratamiento de la causa micción normal.
Cirugía

Bibliografía:

https://www.msdmanuals.com/es-mx/professional/trastornos-urogenitales/trastornos-de-la-micci%C3%B3n/retenci%C3%B3n-urinaria#v1052249_es

<https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-urologicas/retencion-urinaria#:~:text=La%20retenci%C3%B3n%20urinaria%20es%20una,la%20vejiga%20de%20la%20orina.>

<https://medlineplus.gov/spanish/urinaryincontinence.html#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20incontinencia%20urinaria,gran%20medida%20su%20vida%20diaria.>