



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE
LIC. EN MEDICINA HUMANA**

**SEXTO SEMESTRE
TERCER PARCIAL**

**SUPER NOTA
LEPRA**

**DOCENTE: Dra. Katia Paola Martínez López
ALUMNA: Angélica Montserrat Mendoza Santos**

La lepra, denominada también enfermedad de Hansen, es una infección granulomatosa crónica que afecta, preferentemente, a los tejidos superficiales y los nervios periféricos.

LEPRA

Vía respiratoria

Secreciones respiratorias de un infectado

Piel lesionada

Contacto piel con piel (Piel lesionada)

Convivencia

Convivencia con una persona infectada

Madre a Hijo

Leche materna
Transplacentaria

VÍAS DE TRANSMISIÓN

TIPOS DE TUBERCULOSIS

LEPROMATOSA En esta forma las lesiones cutáneas son extensas y simétricas. Suele tratarse de máculas, nódulos, placas o pápulas. Los bordes están mal definidos y la parte central de las lesiones está elevada e indurada y es convexa en lugar de cóncava, como en los casos de lepra tuberculoide.

TUBERCULOIDE La lesión inicial de este tipo de lepra suele ser una mácula hiperpigmentada muy bien delimitada e hipoestésica. Más adelante, esta lesión aumenta de tamaño por expansión periférica y sus bordes adquieren un aspecto elevado y circundado o con circunvoluciones.

Las lesiones son anestésicas y presentan pérdida de los órganos cutáneos normales, como **glándulas sudoríparas y folículos pilosos**. La afección nerviosa se produce en la fase inicial, y los nervios superficiales que atraviesan las lesiones presentan un aumento de tamaño; **los nervios periféricos de mayor calibre, como el cubital, perineo y los más próximos a la lesión, pueden ser**

Las localizaciones más frecuentes son la cara (**mejillas, nariz, cejas**), **pabellones auriculares, muñecas, codos, nalgas y rodillas**. Es frecuente la pérdida de las partes laterales de las cejas y, en estadios avanzados, la piel de la cara y de la frente presentan engrosamiento y arrugamiento (**facies leonina**), mientras que los lóbulos de los pabellones auriculares aumentan de tamaño y muestran un aspecto de péndulo.

M. LEPRAE

Bacilo de Hansen
Pleomorfo Pertenece a la familia Mycobacteriaceae

Aerobio Invasor

No móvil

No esporogeno (No capsula)

Acido alcohol resistente (BAAR) Gram + (Tinción especial)

SINTOMAS GENERALES

La enfermedad afecta principalmente: La piel, los nervios periféricos, la mucosa del tracto respiratorio superior y los ojos.

Las manifestaciones incluyen: Lesiones cutáneas hipopigmentadas o rojizas con pérdida de sensibilidad.

