

NOMBRE DEL ALUMNO: Mario De Jesús Santos Herrera

NOMBRE DEL PROFESOR: DR. MIGUEL MAZA LOPEZ

LICENCIATURA: MEDICINA HUMANA

GRUPO: 6° A

MATERIA: PEDIATRIA

NOMBRE DEL TRABAJO: cuadro básico de vacunación

San Cristóbal De Las Casa, Chiapas a 30 de JUNIO de 2023

ESQUEMA DE VACUNACION

| CARACTERISTICAS | BCG | HEPATITIS B | HEXAVALENTE DPAT+VPI+HIB+HEPB | DTP |
|-------------------------|---|---|---|---|
| EDAD DE VACUNACION | AL NACER | AL NACIMIENTO, 2 MESES, 6 MESES DE EDAD. | 2 MESES, 4 MESES 6 MESES 18 MESES | 4 AÑOS |
| ENFERMEDAD QUE PREVIENE | TUBERCULOSIS MENINGEA Y MILIAR | HEPATITIS B | DIFTERIA, TOSFERINA, TETANOS, POLIOMELITIS, HEPATITIS B Y ENFERMEDADES GRAVES POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B, COMO NEUMONIA Y MENINGITIS | DIFTERIA, TOSFEERINA Y TETANOS |
| DOSIS | UNICA | 3 DOSIS | 4 DOSIS | REFUERZO |
| TIPO BIOLÓGICO | CEPA ATENUADA DE MYCOBACTERIUM BOVIS | CONCENTRADO DE INMUNOGLOBULINAS CONTRA LA HEPATITIS B (IGHB). | | |
| VIA APLICACION | INTRADERMICA | INTRAMUSCULAR | INTRAMUSCULAR | INTRAMUSCULAR |
| REGION ANATOMICA | DELTOIDEA DERECHA | MUSCULO IZQUIERDO DE LA PIERNA | MUSLO IZQUIERDO DE L APIERNA | DELTOIDEA IZQUIERDO |
| CONTRA INDICACIONES | INMUNOSUPRIMIDO, LEUCEMIA, VIH Y ALERGIAS | VIH, FIEBRE, INMUNODEFICIENCIA, EMBARAZO | FIEBRE, ALERGIA GRAVE, ENFERMEDAD GRAVE. | FIEBRE, ENFERMEDAD GRAVE, ENFERMEDAD NEUROLOGICA PROGRESIVA, CRISIS CONVULSIVA. |
| EFFECTOS SECUNDARIOS | FIEBRE, PAPULA EN EL AREA DE APLICACION, VOMITOS, MALESTAR ESTOMACAL | FIEBRE, VOMITO, DIARREA, DOLOR ABDOMINAL, CEFALEA, ESCALOFRIOS, DOLOR MUSCULAR. | FIEBRE, FATIGA, NAUSEAS, VOMITO, DIARREA, DOLOR ABDOMINAL, CEFALEA, ESCALOFRIO S. | ALESTAR, IRRITABILIDAD, FIEBRE, CRISIS CONVULSIVA POR FIEBRE, RONCHAS. |

| CARACTERÍSTICAS | ROTAVIRUS | NEUMOCÓCICA CONJUGADA | INFLUENZA | SRP (TRIPLE VIRAL) |
|-------------------------|--|--|---|---|
| EDAD DE VACUACION | 2 MESES 4 MESES | 2 MESES 4 MESES 12 MESES | 6 MESES 1 MESES DE LA PRIMERA 1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS | 12 MESES 18 MESES 2 DOSIS |
| ENFERMEDAD QUE PREVIENE | DIARREA POR ROTAVIRUS | NEUMONIA, MENINGITIS Y OTRAS | DIFTERIA, TOSFERINA, TETANOS, POLIOMELITIS, HEPATITIS B Y ENFERMEDADES GRAVES POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B, COMO NEUMONIA Y MENINGITIS | SARAMPION, RUBEOLA Y PAROTIDITIS |
| DOSIS | 2 DOSIS | 3 DOSIS | 2 DOSIS Y CADA TEMPORADA INVERNAL. | 2 DOSIS |
| TIPO BIOLÓGICO | VIRUS VIVOS ATENUADOS (DEBILITADOS) QUE CONTIENE UN SEROTIPO DEL VIRUS. | POLISACÁRIDA CONJUGADA A 10 O 13 VALENTES | RACCIONES DE VIRUS MUERTOS | VIRUS VIVOS ATENUADOS (DEBILITADOS). |
| VIA APLICACION | ORAL | INTRAMUSCULAR | INTRAMUSCULAR | INTRAMUSCULAR |
| REGION ANATOMICA | BOCA GOTAS | ANTEROLATERAL MUSCULO IZQUIERDO DE LA PIERNA | MUSLO IZQUIERDO DE LA PIERNA | DELTOIDEA IZQUIERDO |
| CONTRA INDICACIONES | ALERGIAS, NIÑOS MAYORES DE 8 MESES DE EDAD. | ALERGIA, FIEBRE, IRRITABILIDAD, | <6 MESES, ALERGIA AL HUEVO, FIEBRE. | FIEBRE, ENFERMEDAD GRAVE, ENFERMEDAD NEUROLOGICA PROGRESIVA, CRISIS CONVULSIVA. |
| EFECTOS SECUNDARIOS | FIEBRE, VOMITOS, MALESTAR ESTOMACAL, VOMITOS LEVES, ESCURRIMIENTO NASAL. | FIEBRE, PERDIDA DE APETITO | DOLOR MUSCULAR, DOLOR DE ARTICULACIONES, ALERGIA, CEFALEA, ESCALOFRIO Y MALESTAR GENERAL. | MALESTAR GENRAL, DOLOR, CEFALEA, TOS Y FIEBRE. |

| OTRAS VACUNAS | MENINGOCOCO | VARICELA | HEPATITIS A | VPH |
|-------------------------|--|--|--|---|
| EDAD DE VACUACION | 11 Y 12 AÑOS 16 AÑOS 2 DOSIS | 12 A 15 MESES 4 A 6 AÑOS | 12 A 23 MESES 6 MESES DESPUES DE LA PRIMERA DOSIS. | 5° DE PRIMARIA 11 AÑOS NO ESCOLARIZADOS. 2 DOSIS A LOS 6 MESES DE LA 1 APLICACION. |
| ENFERMEDAD QUE PREVIENE | MENINGOCOCICA A,C,W Y | VARICELA | HEPATITIS A | PAPILOMA HUMANO |
| DOSIS | 2 DOSIS | 2 DOSIS | 2 DOSIS | 2 DOSIS |
| TIPO BIOLOGICO | | VIRUS VIVOS | | PARTÍCULAS NO INFECCIOSAS SIMILARES AL VPH. |
| VIA APLICACION | INTRAMUSCULAR | INTRAMUSCULAR | INTRAMUSCULAR | INTRAMUSCULAR |
| REGION ANATOMICA | MUSCULO DEL TOIDES O MUSLO ANTEROLATERAL | MUSCULO DEL TOIDES IZQUIERDO | MUSLO IZQUIERDO DE LA PIERNA | DEL TOIDEA DERECHO |
| CONTRA INDICACIONES | HIPERSENSIBILIDAD, FIEBRE. EMBARAZO Y LACTANCIA | ALERGIA, FIEBRE, IRRITABILIDAD, | FIEBRE, ALERGIA. | FIEBRE, EMBARAZO, ALERGIA. |
| EFECTOS SECUNDARIOS | FIEBRE, DOLOR EN ZONA DE APLICACION, LLANTO Y IRRITABILIDAD. | DOLOR DE BRAZO, ENROJECIMIENTO, FIEBRE,SARPULLIDO. | DOLOR MUSCULAR, DOLOR DE ARTICULACIONES, ALERGIA,CEFALEA, ESCALOFRIO Y MALESTAR GENARAL. | DOLOR DE CABEZA, CONGESTIÓN NASAL, DESMAYO, FIEBRE, FATIGA, MALESTAR, DOLOR MUSCULAR, DOLOR ARTICULAR Y SÍNTOMAS GASTROINTESTINALES |
| | | | | |