



Mi Universidad

Cuadro sinóptico.

Nombre del Alumno: **HERNÁNDEZ URBINA ANTONIO RAMÓN.**

Nombre del tema: **ESQUEMA IDEAL DE VACUNACIÓN.**

Parcial: **CUARTO.**

Nombre de la Materia: **PEDIATRIA.**

Nombre del profesor: **DR. MAZA LÓPEZ MIGUEL.**

Nombre de la Licenciatura: **MEDICINA HUMANA.**

Cuatrimestre: **SEXTO.**

NOMBRE DE LA VACUNA:	ENFERMEDAD CONTRA LA QUE PREBIENE.	TIPO DE BIOLÓGICO:	ESQUEMA DE APLICACIÓN:	VÍA DE APLICACIÓN Y REGIÓN ANATOMICA DONDE SE APLICA:	CONTRAINDICACIONES:	EFECTOS SECUNDARIOS MAS COMUNES:
BCG.	Tuberculosis meningea y miliar.	Vivas atenuadas.	Al nacer. Dosis única.	Intradérmica. Región deltoidea del BD.	Embarazo. Enfermos de leucemia. inmunosupresores e inmunodeficiencias primarias.	Irritabilidad. Dolor en la zona de la vacuna. Inflamación.
Hepatitis B.	Hepatitis B.	Virus con ADN circular y parcialmente de doble cadena.	Al nacer. Dosis única.	Intramuscular. Tercio medio de la cara anterolateral externa del mi <18 meses. Región deltoidea del BD >18 meses.	Reacción alérgica grave (anafilaxia) a una dosis previa o a cualquier componente de la vacuna.	Pérdida de apetito. Fiebre. Cansancio. Náuseas. Diarrea. Vómito.
Hexavalente DPaT+VPI+Hib +HepB.	Difteria, tosferina, poliomelitis, hepatitis B y enfermedades graves por haemophilus influenzae tipo b.	Vacuna triple bacteriana acelular.	2, 4, 6, 18 meses.	IM. Tercio medio de la cara anterior lateral externa del MD.	Anafilaxia. Encefalopatía.	Fiebre. Convulsiones. Flacidez.
DPT.	Difteria, tosferina y tetanos.	Toxoides.	4 años. Refuerzo	IM. Región deltoidea o tricaptal del BI.	Anafilaxia, encefalopatía,	Fiebre. Irritabilidad. Cansancio. Pérdida del apetito.

Rotavirus.	Diarrea por rotavirus.	Virus atenuados.	2 y 4 meses.	Oral.	Anafilaxia. Inmunodeficiencia.	Irritabilidad. Diarrea. Vomito.
Neumocócica conjugada.	Neumonía, meningitis y otras enfermedades graves causadas por neumococo.		2, 4, 12 meses.	IM. Tercio medio de la cara anterolateral externa del MD.	Anafilaxia.	Irritabilidad. Cansancio. Fiebre. Escalofríos. Dolor de cabeza y muscular.
Influenza.	Neumonía por virus de la influenza A y B.	Virus ARN.	Primera: a partir de los 6 meses, segunda: al mes de la primera, una dosis cada temporada invernal: 1, 2, 3 y 4 años.	IM. MI < 18 meses y >18 meses en el brazo izquierdo.	Inmunosuprimidos. Gripe. Algunos medicamentos.	Fiebre. Dolor de cabeza y muscular.
SRP (triple viral).	Sarampión, rubeola y parotiditis.	Virus vivos atenuados.	Primera dosis: 12 meses, segunda dosis: a partir de los 18 meses.	Subcutánea. Región deltoidea o tricipital del brazo izquierdo.	Anafilaxia. Inmunodeficiencia primaria o adquirida. Embarazo.	Dolor. Enrojecimiento e hinchazón en el lugar de la aplicación. Fiebre. Sarpullido.
Meningococo.		Conjugada tetravalente.	Primera dosis: 9 meses, segunda dosis: 12 meses.	IM.	Anafilaxia.	Dolor. Enrojecimiento. Dolor de cabeza y muscular. Fiebre. Escalofríos.
Varicela.	Varicela zoster.	Virus vivos atenuados.	Primera dosis: 12 meses, segunda dosis: entre 4 y 6 años.	SC. Región deltoidea o tricipital del BI.	Anafilaxia. Embarazo. Inmunodeficiencia primaria o adquirida.	Dolor. Enrojecimiento. Hinchazón. Fiebre.
Hepatitis A.	Hepatitis A.	Inactivado.	Dosis única. De	IM. <18 meses	Anafilaxia.	Fiebre.

			1 a 18 años de edad.	tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo y >18 meses en el musculo deltoides.	Menores de un año de edad.	Perdida del apetito. Dolor de cabeza. Irritabilidad.
VPH.		Vacuna recombinante tetravalente.		IM. Región deltoidea del brazo.	Anafilaxia.	Dolor. Hinchazón. Dolor de cabeza. Cansancio. Nauseas.