



**ALUMNO**

**UZIEL DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ**

**DOCENTE:**

**DRA. OLGA CAROLINA MONTERO REYES**

**ASIGNATURA:**

**SALUD PUBLICA II**

**ACTIVIDAD:**

**MAPA CONCEPTUAL DE ENT**

**CARRERA:**

**MEDICINA HUMANA**

**LUGAR Y FECHA:**

**TAPACHULA CHIAPAS A 2/06/2023**

# ENT

## ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

## ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES

## ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

### IAM

Muerte del musculo cardiaco por una obstrucción del flujo coronario

#### MANIFESTACION CLINICA

Dolor intenso en el pecho que no suele ceder sin tratamiento.

Si el área del infarto es suficientemente grande afectara al sistema electrico del corazón puede ocasionar la muerte.

### AP

Dolor intenso en el pecho producida por una obstrucción cronica y parcial del flujo coronario..

#### MANIFESTACIONES

El dolor suele desencadenarse en situaciones de mayor demanda de sangre. (ejercicio, estres, frio)

### ICTUS ISQUEMICO

#### EMBOLICO

Trombo formado a distancia y transportado por los vasos arteriales hasta obstruir la circulación.

#### MANIFESTACIONES

-Antes de las 24 hrs se trata de una ataque isquemico transitorio.  
-Mas allá de las 24 hrs. se trata de un ictus completo.  
-Cuando se produce la muerte durante los primeros 28 dias se le conoce ictus letal

#### TROMBOLICO

Interrupción del flujo puede producirse un trombo formado en el mismo lugar de la oclusión.

#### SIGNOS Y SINTOMAS

cefalea, nauseas, vómitos, perdida de visión, perdida del habla, perdida de comprensión de lenguaje, perdidas de funciones motoras

#### DIAGNOSTICO

Se basa inicialmente en los signos y sintomas clínicos dependiendo de que ictus presente el paciete.

### EPOC

se caracteriza por una limitación de flujo de aire (respiratorio) que puede o no ser completamente reversible.

#### PREVENCIÓN

-La supresión del tabaquismo actividad aislada.  
-Protección de los niños frente al tabaquismo pasivo.  
-Evitar la exposición a contaminantes.

### ASMA

Es una enfermedad inflamatorias de las vías aéreas a la que se asocia intensa hiperrespuesta bronquial frente a obstrucción de los bronquios.

#### FACTORES DE RIESGO

Exposición a contaminantes aéreos en el hogar y en el lugar laboral.

#### FACTORES DE RIESGO

Sexo, historias familiar, nacimiento prematuro o bajo peso al nacer, infecciones respiratorias en la infancia, tabaquismo materno.

# ENT

## DIABETES MELLITUS

### DIABETES TIPO I

Consecuencia de la destrucción de las células beta del páncreas que se acompañan en déficit absoluto de insulina

#### FACTORES DE RIESGO.

La prevención de la diabetes tipo II va de la mano con la prevención de la obesidad

- 1 Obesidad
- 2 Sedentarismo

### DIABETES TIPO II

Se asocia a un efecto progresivo de las células beta que conlleva disminución en la secreción de insulina.

#### OTROS FACTORES DE RIESGO.

- 1 dieta pobre en fibra, verduras y frutas.
- 2 tabaco.
- 3 bajo peso al nacer.

## ENFERMEDADES OSTEOMUSCULAR

### MANIFESTACIONES CLÍNICAS

- Dolor
- tumefacciones
- rigidez

#### PIE VARO

Defecto en el pie donde se encuentra torcido o fuera de su posición en la que se debe encontrar.

**PIE VALGO**  
Parte de los tobillos se hacen hacia la parte de adentro y la parte anterior esta hacia los laterales

#### AFECCIÓN

Afectan a las personas en edad adulta y fundamentalmente a los miembros de la llamada tercera edad o jubilados.

#### TRASTORNOS INFANTOJUVENILES

algunos nde estas estructuras pueden manifestarse en las manos sindactilia o polidactilia.

## ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS

Conjuntos de entidades caracterizada por una muerte neuronal gradual o inexorable, con un comienzo insidioso y una evolución prolongada

#### ALZHEIMER

Es una demencia degenerativa primaria de origen desconocido que se inicia generalmente a partir de los 60 años de forma gradual y progresa con lentitud.

#### DIAGNOSTICO

- Anamnesis clínica
  - Aplicar cuestionarios
  - Exploración neurológica
- F. RIESGO**
- Diabetes
  - Obesidad
  - Depresión
  - Tabaquismo

### DEMENCIA

Síndrome clínico caracterizado por la pérdida de la memoria

#### DEMENCIA VASCULAR

Hace referencia al deterioro cognoscitivo originado a través de enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico-hipóxico

#### F. DE RIESGO

- Edad avanzada
- HAT
- Diabetes mellitus
- Dislipidemias
- Tabaquismos
- Alcohol

#### PARKINSON

Segundo trastorno neurodegenerativo por su frecuencia tras la enfermedad de Alzheimer esto se caracteriza por:

- bradicardia
- temblor en reposo

#### SINTOMAS

- Ansiedad
- Irritabilidad
- Demencia
- Trastorno del sueño
- Fatiga