



Mi Universidad

Supernotas

Nombre del Alumno: José Francisco Pérez Pérez

Nombre del tema: Depresión, Esquizofrenia, Trastorno Bipolar, Ansiedad

Parcial: 4to

Nombre de la Materia: Neurología

Nombre del profesor: Dr. Miguel Basilio Robledo

Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana

6to semestre

TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR



CRITERIO A

5 o más de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo período de dos semanas y representan un cambio del funcionamiento previo; al menos uno de los síntomas es: 1. Estado de ánimo deprimido, 2. Pérdida de interés o de placer



CRITERIO A

1.- Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende de la información subjetiva 2.- Disminución del interés o del placer por todas o casi todas las actividades 3.- Alteración del peso corporal 4.- Insomnio o hipersomnias casi todos los días 5.- Agitación o retraso psicomotor casi todos los días 6.- Fatiga o pérdida de energía casi todos los días



CRITERIO A

7.- Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada casi todos los días 8.- Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o para tomar decisiones, casi todos los días 9.- Pensamientos de muerte recurrentes, ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo



CRITERIO B

Los síntomas causan malestar clínico significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento



CRITERIO C

El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica



CRITERIO D

El episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, un trastorno esquizoforme, un trastorno delirante, u otro trastorno especificado o no especificado



CRITERIO E

Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco

FUENTE DE INFORMACIÓN:

Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales - DSM-5

TRASTORNO DEPRESIVO PERSISTENTE (DISTIMIA)



CRITERIO A

Estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, presente más días que los que esta ausente, según se desprende de la información subjetiva o de la observación por parte de otras personas, durante un mínimo de dos años



CRITERIO B

Presencia, durante la depresión, de dos o mas de los siguientes:

- 1- Poco apetito o sobrealimentación
- 2.- insomnio o hipersomnia
- 3.- Poca energía o fatiga
- 4.- Baja autoestima
- 5.- Falta de cocentracion o dificultad para tomar desiones
- 6.- Sentimientos de desesperanza



CRITERIO C

Durante el período de dos años de la alteración, el individuo nunca ha estado sin los síntomas de los Criterios A y B durante más de dos meses seguidos



CRITERIO D

Los criterios para un trastorno de depresion mayoy pueden estar continuamente presentes durantes dos años



CRITERIO E

Nunca ha haido un episodio maniaco o hipomiano y nuca se ha cumplido los criterios para el trastorno ciclotimico



CRITERIO F

La alteración no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo persistente, esquizofrenia, un trastorno delirante, u otro trastorno especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia y otro trastorno psicótico



CRITERIO G

Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiologicos de una sustancia o a otra afeccción médica

FUENTE DE INFORMACIÓN:

Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales - DSM-5

Esquizofrenia

ELABORADO POR
JOSÉ FRANCISCO PÉREZ
PÉREZ

CRITERIO A

Dos o más de los síntomas siguientes, cada uno de ellos presente durante una parte significativa de tiempo durante un período de un mes. 1. Delirios, 2. Alucinaciones 3. Discurso desorganizado 4. Comportamiento catatónico 5.- Síntomas negativos




CRITERIO B

Durante una parte significativa del tiempo desde el inicio del trastorno, el nivel del funcionamiento en uno o más ámbitos principales, como el trabajo, las relaciones interpersonales o el cuidado personal, está muy debajo del nivel alcanzado antes del inicio



CRITERIO C

Los signos continuos del trastorno persisten durante un mínimo de seis meses. Este periodo de seis meses ha de incluir al menos un mes de síntomas que cumplan el criterio A. Durante estos periodos prodromicos o residuales, los signos del trastorno se pueden manifestar unicamente por síntomas negativos



CRITERIO D

Se han descartado el trastorno esquizoafectivo y el trastorno depresivo o bipolar con características psicóticas por que 1) no se han producido episodios maniacos o depresivos mayores de forma concurrente con los síntomas de fase activa 2) Si se han producido episodios del estado de ánimo durante total de los periodos activo y residual de la enfermedad



CRITERIO E

El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., una droga o medicamento) o a otra afección médica



CRITERIO F

Si existen antecedentes de un trastorno del espectro autista o de un trastorno de la comunicación de inicio en la infancia, el diagnóstico adicional de esquizofrenia solo se hace si los delirios o alucinaciones notables, además de los otros síntomas requeridos para la esquizofrenia, también están presentes durante un mínimo de un mes



DESARROLLO Y CURSO

Los síntomas psicóticos de la esquizofrenia aparecen típicamente entre la adolescencia tardía y la mitad de la treintena; el inicio antes de la adolescencia es raro



FUENTES DE INFORMACIÓN:

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales - DSM - V

Trastorno Bipolar 1

Realizado por

José Francisco Pérez Pérez

criterios diagnósticos

EPISODIO MANIACO

1

Criterio A

Un periodo bien definido de estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable y un aumento anormal y persistente de la actividad o la energía, que dura como mínimo una semana y está presente la mayor parte del día, casi todos los días



2

Criterio B

Durante el periodo de alteración del estado de ánimo y aumento de la energía o la actividad existen tres o más de los siguientes en un grado significativo y representan un cambio notorio del comportamiento habitual

- Puedes crear un listado con tus ideas principales.

Criterio B

1. Aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza
2. Mas hablador de lo habitual o presión para mantener la conversación
3. Fuga de ideas o experiencia subjetiva de que los pensamientos van a gran velocidad



Criterio C

La alteración del estado del ánimo es suficientemente grave para causar un deterioro importante en el funcionamiento social o laboral, para necesitar hospitalización con el fin de evitar daño a si mismo o a otro



fuentes

Manual Diagnóstico y Estadístico De Los Trastornos Mentales - DSM-5

Trastorno Bipolar 1

Realizado por

José Francisco Pérez Pérez

criterios diagnósticos

EPISODIO de DEPRESION MAYOR

1

Criterio A

5 o más de los siguientes han estado presentes durante el mismo periodo de dos semanas y representan un cambio del funcionamiento anterior, al menos uno de los síntomas es 1 estado de ánimo deprimido 2 pérdida de interés o de placer



2

Criterio A

1.- Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día casi todos los días 2.- Disminución del interés o placer 3.- Alteración del peso corporal 4.- Insomnio o hipersomnias casi todos los días 5.- Agitación o retraso psicomotor

- Puedes crear un listado con tus ideas principales.

Criterio B

Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento



Criterio C

El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica



fuentes

Manual Diagnóstico y Estadístico De Los Trastornos Mentales - DSM-5



Trastorno

ANSIEDAD

Generalizada

Elaborado por: José Francisco Pérez Pérez

CRITERIO A

Ansiedad y preocupación excesiva que se produce durante más días los que ha estado ausente durante un mínimo de seis meses, relación con diversos sucesos o actividades



CRITERIO B

Al individuo le es difícil controlar la preocupación




CRITERIO C

La ansiedad y la preocupación se asocian a tres o más de los seis síntomas siguientes: 1.- Inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta 2.- Facilidad para fatigarse 3.- Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco 4.- Irritabilidad 5.- Tensión muscular 6.- Problemas de sueño



CRITERIO D

La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral y otras áreas importantes del funcionamiento



CRITERIO E

La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia / p. e., drogas o un medicamento) ni otra afección médica



Bibliografía

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales - DSM – V

1. Trastornos Depresivos, pagina 155
2. Trastorno Esquizofrenia, pagina 87
3. Trastorno bipolar, pagina 123
4. Ansiedad, pagina 189