

ESQUIZOFRENIA

A



Dos o mas de los síntomas siguientes, cada uno de ellos presentes durante una parte significativa de tiempo durante el periodo de 1 mes

Durante una parte significativa del tiempo desde el inicio del trastorno, el nivel del funcionamiento en uno o mas ambitos principales

B



Los signos continuos del trastorno persisten durante un minimo de 6 meses. En al menos un mes se cumplen los síntomas mas significativos

C



Se ha descartado el trastorno esquizoafectivo y el trastorno depresivo o bipolar con características psicóticas

D

E

El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o a otra afección médica

TRANSTORNO BIPOLAR I

A



Un período bien definido de estado de ánimo anormalmente y persistente elevado, irritable y aumento anormal de la actividad o energía sobre un objetivo

Período de la alteración del estado de ánimo y aumento de la energía

B



Alteración del estado de ánimo, causando deterioro importante en el funcionamiento social o laboral

C

El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia como droga, un medicamento o otro tratamiento como afección médica

D

DEPRESIÓN

A

Accesos de cólera graves y recurrentes que se manifiestan verbalmente (p. ej., rabietas verbal y/o con el comportamiento (p. ej., agresión física a personas o propiedades)

Los accesos de cólera no concuerdan con el grado de desarrollo

B

C

Los accesos de cólera se producen, en término medio, tres o más veces por semana

El estado de ánimo éntre los accesos de cólera es persistentemente irritable o iracible la mayor parte deñ día, casi todos los días

D



E

El primer diagnóstico no se debe hacer antes de los 6 años o después de ios 18 años

ANSIEDAD

A

Miedo o ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo concerniente a su separación de aquellas personas por las que siente apego

El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente, dura por lo menos cuatro semanas en niños y adolescentes típicamente seis o más meses en adultos.

B

C

La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, académico, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento

La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental, como rechazo a irse de casa por resistencia excesiva al cambio en un trastorno del espectro autista, delirios o alucinaciones

D

