



Ensayo

Nombre del Alumno: José Francisco Pérez Pérez

Nombre del tema: Exploración del recién nacido, Taquipnea del recién nacido e hipertensión pulmonar persistente en el recién nacido

Parcial: 3°

Nombre de la Materia: Pediatría

Nombre del profesor: Dr. Guillermo Del solar Villarreal


Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana

6to semestre

INTRODUCCION

En la presente investigación se dará a conocer algunas de las afectaciones que pueden existir en el recién nacido, como: Hipertensión pulmonar persistente que se basa en un fracaso en el cierre de la comunicación entre la arteria aórtica y la arteria pulmonar manifestando el recién nacido disnea, cianosis, incremento de la frecuencia respiratoria y cardíaca. Así también, La taquipnea transitoria del recién nacido que se basa en una afectación autolimitada que puede durar entre 48 y 72 horas pero cuando la taquipnea continúa después de este lapso de tiempo se deberá considerar otras afectaciones como una dificultad respiratoria del recién nacido. La taquipnea es el incremento de la frecuencia respiratoria en un minuto que, en esta alteración puede dar hasta 72 RPM. En la exploración física se explica los pasos y el orden que se realizará en el recién nacido, inmediatamente al nacer lo primero que se nota es la coloración de la piel, si el bebé no presenta cianosis o acrocianosis, ictericia u otras. Posteriormente se lleva a una cuna térmica donde el bebé deberá estar a una temperatura aproximadamente de 36.6 grados Celsius, así como sus signos vitales, perímetro cefálico, etc.

**HIPERTENSION PULMONAR
PERSISTENTE DEL
RECIEN NACIDO**



CONCLUSION

Se demostro cada afectacion abarcando sus definiciones, manifestaciones clinicas, metodos o formas de diagnosticarlo, asi como algunas de las complicaciones, factores de riesgo, tratamiento que en algunos de estos incluyen soporte de oxigeno, algunos se demostro la ineficacia de algunos medicamentos y una breve explicacion del por que sucede o su aparicion. Algo que es de destacar es que la los factores de riesgo se basa en los cuidado de la madre durante el embarazo, es decir, si la madre fumadora durante la gestacion o padecio de diabete mellitus predispone a que su bebé nasca con taquipnea tranquisotoria o incluso hipertension pulmonar persistente.

BIBLIOGRAFIA

- EXAMEN FISICO DEL RECIEN NACIDO NORMAL – Guia de sanjosé- Dr. German Muhlausen M.
- Guia de Practica clinica – Diagnostico y Tratamiento de la Taquipnea Transitoria Del RECIÉN NACIDO – 2016
- HIPERTENSION PULMONAR PERSISTENTE DEL RECIEN NACIDO – Revista mexicana de Pediatría – Juan jose Gasque Gongora - Medigraphic