



María Fernanda García Hernández

Q.F.B. Hugo Nájera Mijangos

Bacterias en Vías urinarias

Microbiología y parasitología

PASIÓN POR EDUCAR

Segundo “B”

Comitán de Domínguez Chiapas a 27 de mayo del 2023.

BACTERIAS DE VÍAS URINARIAS

NEISSERIA GONORRHOEAE

Características

Se obtiene por contacto sexual

Incubación de 2 días a 1 semana

Patologías

- Daño por células inflamatorias
- Genitales: Ureter y uretra
- Recto
- Garganta
- Conjuntivitis

CLINICA

Mujeres

Hombres

Trasplacentaria

1° etapa

2° etapa

- Destrucción del epitelio
- Endocarditis
- Secreción purulenta
- 80% asintomaticas

- Daño uretral
- Infección en matriz
- Esterilidad
- Bacteremia o septicemia

- Uretritis
- Enrojecimiento y escozor
- Agrietamiento del pene
- Testículos inflamados
- Esterilidad

- Infección por conducto vaginal
- Oftalmia neonatal
- Artritis septica
- Lesiones en piel

GARDNERELLA VAGINALIS

se obtiene

Contacto sexual

produce

Vaginosis

Características

- NO hay PMN'S
- Presencia de células clave
- Solo en mujeres

Clinica

Asintomática

Sintomática

Ginecológicas

produce

- Secreción abundante, incolora o blanquecina
- Olor a pescado
- Molestia vaginal

genera

- Endometritis
- EPI
- Aborto
- Parto prematuro

CLAMYDIA TRACHOMATIS

Cacterísticas

- Bacteria intracelular
- Serotipos D y K
- Proctitis
- Conjuntivitis
- Neumonía
- Bubón

patologías

Tracoma

Linfogranuloma venereo

clinica

Hombres

Mujeres

- Uretritis
- Testículos inflamados
- Secreción
- Ardor al miccionar

- Flujo espumoso
- Cervicitis
- EPI
- Sangrado en el sexo
- Fiebre

TREPONEMA PALLIDUM

causa

Sifilis

estados

Adquirida

Congénita

Primaria

Secundaria

Terciaria

Aborto

Vivos

inicia

Incubación de 2-10 semanas

forma

Pápulas

genera

Úlcera

viajando

A la linfa infectando

ocurre

Bacteremia

luego

Exantema macupapuloso

Candilomas

finalmente

Se disemina a torrente sanguíneo

Se produce

5 años después

siendo

Incurable

provocando

- Alopecia
- Lesiones granulomatosas

genera

Queratitis

Dientes quebrados

Periostitis

Anomalías SNC

Sordera

características

- Causa Chancro blando
- Lesión en piel

clinica hombres

Úlceras en pene

puede llegar

Vía linfática

llega

Ganglios inguinales

Hay inflamación

formacion de

Bubón

puede

Romper piel y liberar bacterias