




Universidad del Sureste
Campus Comitán
Medicina Humana



Nombre del tema:

Valoración del niño
menor de 5 años

Nombre del alumno:

Elena Guadalupe Maldonado Fernández

Materia:

Crecimiento y desarrollo

Grado: 3

Grupo: A

Nombre del profesor:

Dr. Miguel Abelardo Ortega Sánchez

Valoración del niño menor de 5 años

Atención del recién nacido

- Historia clínica — Antecedentes maternos
- Cuidados inmediatos
 - Lavado y vestimenta.
 - Verificación y control de equipos.
 - Encender fuente de calor sobre mesa o cuna térmica 37 °c y 28°c.
 - No es necesario aspirar secreciones a todos los RN.
 - Pinzamiento inmediato o tardío.
 - Cordón umbilical debe de ser 15 cms longitud.
 - Corte y ligadura cuando deje de latir, 1-3 min.
 - Compresa estéril y calentada se recibe al RN.
 - Campo seco y tibio secado de cabeza y cara, cuerpo.
 - No estimulación vigorosa.
 - Mientras se da la pinza y corte, iniciamos valoración primaria.
 - Realizar APGAR en todos los RN y Silverman – Anderson
- Silverman-Andersen — Sirven para valorar el esfuerzo respiratorio en el neonato
- APGAR — Exámen rápido que se realiza al 1 y 5´ de nacido el bebé para determinar su condición física
- Cuidados mediatos
 - Piel con piel temprano.
 - Lactancia materna sin restricciones.
 - Alojamiento conjunto 24 hrs.
 - 12 hrs vacuna hepatitis B im, vacuna BCG.
 - 1 dosis única de 1 mg vitamina K im, dentro de 6 hrs.
 - Mantener cordón limpio y seco
- Examen físico
 - Apariencia, color, respiración, comportamiento, actividad y postura.
 - Cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, extremidades, llanto.
- Reflejos primitivos
 - Succión
 - Deglución
 - De moro
 - Búsqueda
 - Babinski
- Somatometría
 - Perímetro cefálico
 - Perímetro torácico
 - Perímetro abdominal
 - Segmento inferior
 - Índice de Miller
 - Peso
 - Longitud
- Capurro — • criterio utilizado para estimar la edad gestacional de un neonato

- Limpieza de cordón es con agua y jabón.
- Baño después de 6 hrs o 24 hrs.

Curvas de crecimiento

- Percentiles
 - Longitud para la edad
 - Peso para la edad
 - Perímetro craneal
 - IMC para la edad
 - Velocidad de crecimiento para la edad
- Definición — Medidas que nos indica teniendo los valores ordenados de menor a mayor
- Fx que intervienen
 - Génética
 - Nutrición
 - Ambiente
 - Endocrinos

Valoración del RN

- Cabeza
 - Fontanelas
 - Saturadas
 - Moldeamientos
 - Implantación de orejas
 - Canal auditivo
 - Pabellón auricular
 - Ojos
 - Narinas permeables
 - Paladar
 - Succión
- Cuello y tórax
 - Ganglios
 - Claviculas
 - Reflejo de presión palmar
 - Reflejo de agarre
 - Reflejo de Moro
 - Glándula mamaria
 - Pezón
 - Piel
- Abdomen
 - Visceromegalias
 - Pared abdominal
 - Cordón umbilical
- Pelvis (genitales) — Barlow y ortolani
- Extremidades inferiores
 - Pliegues de muslos
 - Simetría
 - Pies derechos
 - Presión plantar
 - Babinski
 - Pliegues plantares
- Espalda — Columna vertebral
Sacro

Tamiz neonatal

Estudio que debe realizarse a todos los recién nacidos entre el segundo y quinto día y antes de cumplir 30 días de vida

- Identificación temprana de enfermedades metabólicas
- Análisis de sangre del talón del RN

Vacunas

- Nacimiento — BCG, HB
- 2 meses — Hexavalente acelular, Rotavirus, Neumococo conjugada
- 4 meses — Hexavalente acelular, Rotavirus, Neumococo conjugada
- 6 meses — Hexavalente acelular, influenza 1a dosis en temp. invernial
- 7 meses — Influenza 2da. dosis en la misma temp invernial que la 1a. dosis
- 12 meses — SRP, Neumococo conjugada
- 18 meses — Hexavalente acelular, SRP 2da dosis, influenza dosis anual
- 2 años — Influenza dosis anual
- 3 años — Influenza dosis anual
- 4 años — DPT (refuerzo), influenza dosis anual
- 59 meses — Influenza dosis anual
- 6 años — SRP 2da dosis
- 11 años — VPH