

**UNIVERSIDAD DEL SURESTE
CAMPUS COMITAN
MEDICINA HUMANA**

TEMA:

INFOGRAFIA DE EDAS

**NOMBRE DEL ALUMNO:
LIZBET NOELIA ESTRADA CARBALLO**

**MATERIA:
CRECIMIENTO Y DESARROLLO**

GRADO: 3 GRUPO: "A"

**DOCENTE:
DR. MIGUEL ABELARDO ORTEGA SÁNCHEZ.**



EDAs

1 QUE ES?


LA OMS DEFINE A LA ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA) COMO LA PRESENCIA DE TRES O MÁS DESPOSICIONES EN 24 HRS, CON UNA CONSISTENCIA HABITUAL Y UNA DURACIÓN MENOR DE 14 DÍAS.

PUEDA OCURRIR EN CUALQUIER ETAPA DE LA VIDA PERO SON MÁS VULNERABLES LOS LACTANTES Y NIÑOS <5 AÑOS.



2 CONTAGIO

LA DIARREA ES UNA ENFERMEDAD CAUSADA POR VIRUS (CAUSA MÁS FRECUENTE), BACTERIAS Y PARÁSITOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ALIMENTOS CONTAMINADOS, DESCOMPUESTOS Y EL LAVADO NO CORRECTO DE LAS MANOS.



3 SIGNOS Y SINTOMAS

- MÁS DE 3 EVACUACIONES AGUDAS O LIQUÍDAS EN 24 HRS (CARACTERÍSTICAS DE LAS HECES).
- VÓMITO.
- PUEDA HABER FIEBRE.
- MAL ESTADO GENERAL.
- DEPOSICIONES SANGUIOLENTAS.
- PUJO.
- TENESTE.



4 PREVENCIÓN

- PROMOVER LA LACTANCIA MATERNA LOS PRIMEROS 6 MESES.
- DESINFECCIÓN, MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA.
- LAVADO DE MANOS.
- DESINFECTAR ALIMENTOS.
- COCINAR LIMPIO.
- CONSERVAR LA COMIDA.
- CONSUMIR AGUA PURIFICADA O HERVIDA.
- COCER BIEN LOS ALIMENTOS.



5 PLAN DE HIDRATACIÓN

PLAN A
NO HAY DESHIDRATACIÓN (PREVENCIÓN)

- .ALIMENTACIÓN CONSTANTE
- .BEBIDAS ABUNDANTES
- .CONSULTAS

VSO EN NIÑOS <1 AÑO O <10 KG =75ML

EN NIÑOS >1 AÑO O >10 KG= 150ML

PLAN B

DESHIDRATACIÓN LEVE O MODERADA.

VSO 100 ML/KG/4HRS EN FRACCIONES DE 30 MIN.

SNG=20-30 ML/KG/HRS (SONSA NASOGASTRICA)

REPETIMOS PLAN B Y PASAMOS A PLAN A

PLAN C

DESHIDRATACIÓN GRAVE/CHOQUE HIPOVOLÉMICO.

SOLUCIÓN FISIOLÓGICA 0.9% O HARTMAN.

50 MG/KG-2 HRS

25 MG/KG-2 HRS

25 MG/KG-2 HRS

REPETIMOS PLAN C Y PASAMOS A PLAN B

	A	B	C
1.Preguntar por:			
Sed	Normal	Más de lo normal	Excesiva
Orina	Normal	Poca cantidad, oscura	No orina durante 6 horas
2.Observar			
Aspecto	Alerta	Irritado o decaído	Deprimido o comatoso !!
Ojos y lengua	Normales	Hundidos	Muy hundidos, lora sin lagrimas
Respiración	Húmedas	Secas	Muy secas, sin saliva
Alboreo	Normal	Más rápida de lo normal	Muy rápida y profunda
Flexibilidad de la piel	El pliegue se deshace con rapidez	El pliegue se deshace con lentitud	El pliegue se deshace muy lentamente (más de 2 seg).
Fontanela	Normal	Hundida (se palpa)	Muy hundida (se palpa y se observa)
Pulso	Normal	Más rápido de lo normal	Muy rápido, fino o no se palpa !!
Llenado capilar	Menor de 2 segundos	3 a 5 segundos	Mayor a 5 segundos !!
4.Decida	No tiene deshidratación	Si tiene 2 o más signos o síntomas de deshidratación	Si tiene 2 o más signos o síntomas de deshidratación grave, Si tiene uno o más de los signos marcados con !! →Deshidratación grave con shock hipovolémico
5.Tratamiento	Aplice PLAN A para prevenir la deshidratación	Aplice PLAN B para tratar la deshidratación	PLAN C: Comenzar EV: Si hay shock Si hay vómito incoercible (abundantes o más de 4 en una hora). Si hay ileo. Si hay convulsiones

