

Nombre del alumno: William de Jesús
López Sánchez

Nombre del profesor: Osmar Emanuelle
Vazquez mijangos

DICCIONARIO SOBRE TERMINOLOGÍA MEDICA DE TÓRAX

Materia: propedéutica, semiología y
diagnostico

Grado: 4°

Grupo: "A"

Tórax en embudo: anomalía esquelética del tórax caracterizada por la depresión del esternón. La deformidad puede no interferir con la respiración.

Tórax en quilla: trastorno estructural congénito caracterizado por una proyección anterior marcada de la hipófisis xifoides y la porción inferior del esternón, con alargamiento de los cartílagos costales. Puede producir complicaciones cardiorrespiratorias.

Tórax en tonel: tórax redondeado y grande, considerado normal en algunos individuos bajos y gordos y en los que viven en regiones de gran altitud, los cuales consecuentemente desarrollan un aumento de la cavidad vital. Sin embargo el tórax en tonel también puede ser signo de enfisema pulmonar.

Tórax inestable: trastorno caracterizado por la presencia de múltiples fracturas costales que causan inestabilidad de una parte de la pared torácica y respiración paradójica.

Toracotomía: apertura quirúrgica de la cavidad torácica.

Toracocentesis: perforación quirúrgica de la pared torácica y el espacio pleural mediante una ajuga, al objeto de aspirar líquido con finalidad diagnóstica o terapéutica o para tomar una muestra para biopsia.

Costocondral: relativo a una costilla y su cartílago

Mediastinitis:

Neumomediastino: presencia de aire o gas en los tejidos mediastínicos que en el lactante puede determinar la formación de un neumotórax o un neumoperitoneo, sobre todo cuando simultáneamente padece un síndrome de distrés respiratorio o una neumonitis por aspiración.

Neumohemotorax: acumulación de aire y sangre en la cavidad pleural.

Neumotórax: colección de aire o gas en el espacio en el espacio pleural que hace el pulmón colapse.

Disnea: dificultad para respirar que puede deberse a ciertas enfermedades cardiacas o respiratorias, ejercicio extenuante o ansiedad.

Taquipnea: aceleración anómala de la frecuencia respiratoria, que se observa por ejemplo con la hiperpirexia.

Quilotórax; efusión de quilo del conducto torácico en la cavidad pleural. La causa mas frecuente es la lesión traumática del cuello o la presencia de un tumor que invade el conducto torácico

Ortopnea: proceso anormal en que una persona debe sentarse o permanecer de pie para respirar profunda o confortablemente.

Pectus excavatum: consiste en que las costillas y el esternón crecen hacia dentro, generando una deformación visible en el pecho. Esto da al pecho un aspecto ahuecado o cóncavo

Matidez percutoria: ruido corto, de tonalidad más alta que el anterior, que da la sensación de golpear sobre un sólido, la percusión sobre el muslo es el sonido típico

Síndrome de Tietze: también llamado costocondritis, fue introducido por Alexander Tietze en 1921 y se caracteriza por una insuflación y engrosamiento doloroso de carácter inflamatorio no supurado, el cual se localiza en uno o más cartílagos costoesternales.

Flogosis: Enrojecimiento y calor que caracteriza la inflamación.

Osteocondritis degenerativa: consiste en la necrosis y degeneración de los huesos y cartílagos.

Xifoidalgia: Dolor e incomodidad que ocurre en la porción más baja del esternón llamado apófisis xifoides.

Neuralgias intercostales: es una neuropatía debido a la compresión de los nervios torácicos, lo que produce una sensación de pinchazos o dolor eléctrico desde la columna vertebral hasta el esternón.

Frémitos: Son vibraciones generadas por soplos intensos de baja y media frecuencia (los de alta frecuencia, aunque sean muy intensos, no provocan frémito), que son perceptibles mediante palpación.

Maniobra del enganche de Hartzler: Consiste en palpar el epigastrio con la mano en forma de gancho durante la inspiración, desde la derecha del tórax del paciente.

Dextrocardia: Es una afección en la cual el corazón está apuntando hacia el lado derecho del tórax.

Tremor cordis: Sensación vibratoria parecida al thrill, durante la sístole

Maniobra del talón de Dressler: consiste en apoyar tal porción de la mano sobre el área parasternal, este echo tiene particular utilidad para diferenciarlo de un latido de igual ubicación, pero menos potente a grave.

Tremor cordis presistolico: Sensación vibratoria parecida al thrill, durante la sístole

Maniobra de vasalva: es un esfuerzo para exhalar sin dejar que escape aire por la nariz o por la boca. Las personas a menudo usan una maniobra de Valsalva durante algunas actividades comunes, como al esforzarse para una evacuación intestinal o al sonarse la nariz cuando está tapada.

Eretismo cardiovascular: es un fenómeno que se traduce por una aceleración del ritmo cardíaco provocada por el sistema nervioso simpático.

Simpaticotonía: es una alteración del sistema nervioso autonómico en favor del sistema simpático. Cursa con taquicardia, midriasis, hiperhidrosis y con un aumento de la excitabilidad vasomotora.

Ateromatosis senil: es un proceso inflamatorio multifactorial que afecta la pared de las arterias, tiene una larga evolución exenta de clínica, y se manifiesta en estadios muy evolucionados provocando un evento cardiovascular.

Latidos posextrasistolicos: Son **latidos** extras, que se adelantan al **latido** normal del corazón y que muy frecuentemente se siguen de una pausa.

Homónima izquierda: es una alteración caracterizada por una reducción de campo visual izquierdo, que generan al paciente una gran dificultad en la apreciación del espacio de los objetos que le rodean, creando un problema visual de gran trascendencia para su vida cotidiana.

Signo de gendrin: Percepción del choque de la punta del corazón por encima del límite inferior de la matidez cardíaca. Signo de derrame

BIBLIOGRAFÍA

Libro- Semiología Médica, Argente – Alvarez

Diccionario de medicina OCÉANO MOSBY