



**Universidad Del Sureste
Campus Comitán**

Licenciatura en Medicina Humana

Historia clinica y signos vitales

Félix Alejandro Albores Méndez

**Grupo: "B"
Cuarto semestre
Semiologia**

Vázquez mijangos osmar emmanuel

VENOCLISIS

OBJETIVO

Aprender a canalizar venas periféricas para administrar líquidos o medicamentos con fines terapéuticos.

JUSTIFICACIÓN

Conocer la técnica adecuada para administrar líquidos intravenosos es fundamental para la primera exposición a la práctica médica, ya que la administración de fármacos la ha convertido en una herramienta invaluable en el tratamiento de una amplia variedad de afecciones.

MATERIALES

- Catéter
- Alcohol al 70%
- Algodón
- Ligadura
- Equipo de venoclisis

PROCEDIMIENTO

1. Lavarse las manos.
2. Preparar el equipo y la solución:
3. Quitar el sello hermético del frasco.
4. Realizar asepsia del tapón.
5. Sacar el equipo de venoclisis del paquete.
6. Introducir la bayoneta en el orificio más grande.
7. Cerrar la llave de paso.
8. Colgar el frasco en el tripié.
9. Pasar la solución a la cámara de goteo hasta la mitad.
10. Abrir la llave de paso para purgar el equipo, cerciorándose que no quede aire en él.
11. Dar preparación física:
12. Dar posición cómoda al paciente.
13. Elegir la zona por puncionar y descubrirla.
14. Colocar el brazo en una superficie plana.
15. Colocar la ligadura de 5 a 8 centímetros por arriba de la vena elegida para la punción.
16. Realizar asepsia de la región.
17. Introducir la aguja con el bisel hacia arriba formando un ángulo de 30 grados inmediatamente a un lado de la vena.

18. Bajar la aguja quedando casi paralela a la piel, puncionar la vena y seguir el trayecto venoso.
19. Si está en vena retirar la ligadura.
20. Conectar el equipo de venoclisis al punzocat, retirando previamente el estilete de éste, abrir inmediatamente la llave de paso para que fluya la solución.
21. Fijar la aguja con tela adhesiva.
22. Regular goteo de solución.
23. Anotar en el membrete de la solución la hora de inicio y terminación.
24. Dejar cómodo al paciente.
25. Retirar el equipo y darle los cuidados posteriores al equipo.

COMENTARIOS

La venoclisis es una práctica que se suele utilizar en pacientes que necesitan tomar medicación u otras proteínas o sustancias hidratantes para mostrar una mejoría en su salud, ya que hacerlo mal podría hacer exactamente lo contrario y poner en peligro su vida