



PASIÓN POR EDUCAR

Nombre del alumno:

Rudy Ángel Osvaldo Vázquez
Zamorano

Nombre del profesor:

Dr. Luis Enrique Guillen Reyes

Nombre del trabajo:

“Resumen”

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 6-º.

Grupo: “A”

Comitán de Domínguez Chiapas a 26/06/23

Ictericia neonatal ...

Incidencia ...

- 60% de recién nacidos
- 80% recién nacidos pretermino
- Desarrollan en la primer semana de vida
- Patología más común de requirición hospitalaria neonatal

Definición ...

Coloración amarillenta en piel y mucosas con hiperbilirrubinemia

Factores de riesgo ...

- Edad < 38 semanas
- Ictericia en < 24h
- AMF de ictericia que requirio fototerapia
- Alimentación exclusiva con leche materna

Inspección ...

1. Visual -> mucosas, esclerótica, palmar -> Tono erávil

• Evolución cefalocaudal

• A todos los RN en caso inspección en los primeros 72h, si hay fx riesgo -> nuevo primeros 24h.

• Luz natural

• Coloración visible -> nivel bilirrubinas en primeros 24h

Escala de KRAMER ...

1 Ictericia de cabeza y cuello : < 5mg/dl

2 Ictericia hasta el ombligo : 5-10mg/dl

3 Ictericia hasta las rodillas : 8-16mg/dl

4 Ictericia hasta los tobillos : 10-18mg/dl

5 Ictericia plantar y palmar : > 16mg/dl

- Bilirrubina serica - \rightarrow estenosis de op para dx
- Bilirrubinémico - \rightarrow solo en RN - \rightarrow 35 semanas y edad \rightarrow 24h

- Bilirrubina serica - \rightarrow estenosis de op para dx
- Bilirrubinémico - \rightarrow solo en RN - \rightarrow 35 semanas y edad \rightarrow 24h

• Causas ...

- Incompatibilidad grupo sanguíneo
- Deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa
- Infecciones

• En caso de sospecha específica ...

- Frotis de sangre periférica
- Niveles de SG-PD
- Cultivos microbiológicos

• Tratamiento ...

- Fototerapia - \rightarrow Convierte bilirrubina \rightarrow lamirubina que se excreta
- Requiere Ondas de 460 nm, lámparas con salida 460-490 nm de luz azul
- Respuesta máxima del inicio se alcanza a las 2-4h.