



ALUMNA: ALINA ANAHÍD UTRILLA MORENO

CATEDRÁTICO: LUIS ENRIQUE GUILLEN REYES

TRABAJO: resumen atención al recién nacido sano

MATERIA: pediatría

PASIÓN POR EDUCAR

SEMESTRE: 6

GRUPO: A

ATENCIÓN AL RN

CUIDADOS / importante los antecedentes del producto.

inmediatos

Temperatura del feto dentro del vientre 37.5 .
En quirófano 25°C . Los RN pierden $0.5^{\circ}\text{C}^{\text{xmin}}$ por lo que se debe realizar maniobras rápido. **MATERIALES:**

cuna calor radiante, campo calentado previamente (3)
incubadora (en caso de ser prematuro)

Aspiración de comienza en carrillos y luego narinas.

MATERIAL Perilla de hule estéril, sonda de succión, aspirador de meconio.

Secado. frotar espalda, cabeza, pliegues con fin de secar y estimular (campo previamente calentado). **Señalo-caudal**

FC. 100-160 lpm

Planto y tono muscular si no llora: maniobras de reanimación neonatal, igual si está flácido.

mediatos

Test de APGAR, SILVERMAN, CAPURRO, PINZAMIENTO

DE CORDÓN UMBILICAL: cerca 1 a 2 cm del abdomen

el cordón se seca y desprende 5-8 días, se deja un largo de 2-3 cm más

NO se limpia con alcohol porque se absorbe

Profilaxis ocular clorafenicol 1gt/1 ojo

evaluación de sexo y Examen físico

Medidas antropométricas peso, talla, Perímetro cefálico, torácico, abdominal y extremidades

Toma de sangre del cordón para el tamiz → hipotiroidismo → cuidados extras de vida

SILVERMAN

→ dificultad respiratoria.

10/27/22

Signos	disociación toracoabdominal	traje o retracciones intercostales	retracciones subxifóides	alitos nasal	quejido respiratorio
Puntos					
GRADO 0	sincronizado/normal	ausente	ausente	ausente	ausente
GRADO 1	En inspiración/torax fijo, mueve abdomen.	intercostal	discreta	discreta	se oye con estetosc.
GRADO 2	siempre visible/ respiración y balanceo	marcadas	intensas	intensas	se oye a distancia con el oído

0 SIN dificultad
 1-3 leve
 4-6 moderada
 7-10 Severa

APGAR

Se valora al minuto a los 5 y algunos hasta los 10

10-7 buen estado
 6-4 moderadamente deprimido
 ≤ 3 Severamente deprimido

VALORACIÓN

PUNTOS

	0	1	2
Color de piel	Cianosis	Cianosis en extremidades	Sonrosado
FC	0	< 100 lpm	> 100 lpm
respuesta a estímulos	SIN	muías y llanto débil	llanto, tos, estornudo, mucha actividad
Tono muscular	Flacidez SIN actividad	movim. lento no retráctil	fuerte y regular
respiración	ausente	lenta o irregular	regular

CAPURRO

edad gestacional del RN

Postmaduro +12 semanas
 a término 37-41
 Prematuro leve 35-36
 moderado 32-34
 extremo < 32

204+ puntaje/7
 = edad gestacional

Forma de la oreja	0 aplanada sin incurvación	5 borde sup. fuertemente incurvado	10 Todo borde sup. incurvado	15 Pabellón total incurvado
Tamaño de glandula mamaria	0 No palpable	5 Palpable menor de 5mm	10 Palpable entre 5mm y 15mm	15 Palpable > 10mm
Forma del pezón	0 apenas visible sin areola	5 diametro < 7.5 mm y chata	10 > 7.5mm directa puntada	15 borde levantado areola puntada de diametro > 7.5
textura de la piel	0 Frío	5 fina y lisa	10 mas gruesa y descomposición en manos y pies	15 gruesa con escamas en manos y pies

Exploración Genl.

NOMENCLATURA

Edad Gestacional

Pretermino < 37 sem
a termino 37 - 42 sem
posttermino > 42 sem

Peso al nacer

normal 2500 y 4500g
bajo < 2,500g
alto > 4,500g

Percentiles

< P 10 PEG
10-90 AEG
> P 90 GEG

Otros datos

Talla = 50cm ^{48-52cm}
P.C = 35cm P.Toraco 32cm / Pabd. 30cm
FR = 35-55 rpm
F.C = 120-160 lpm
P.A $\frac{50-70}{53}$ / $\frac{25-45}{\text{días}}$

Expulsión de meconio = 24-48 h
diuresis 24h

Talla: 2-12 años
edad x 6 + 77 = Talla

Exploración física

Piel, lesiones vasculares, cráneo, cuello, tórax, abdomen, genitales, extremidades, neurológica,

Dentición { inicio: incisivos centrales inferiores 6-8 mes
la pérdida de los dientes de leche comienza con la erupción de los primeros molares (6 años)

REFERENCIAS:

- ♥ Nelson. (2020) Tratado de pediatría. Geme III JW, Schor NF. 21^a Edición.



Ali Utrilla