

UNIVERSIDAD DEL SURESTE ESCUELA DE MEDICINA

MATERIA:

Medicina basada en evidencias

CATEDRÁTICO:

Dra. Yaneth Del Roció Maldonado Alfonso

PRESENTA:

Estefany Berenice García Ángeles

TRABAJO:

Trabajos

GRADO Y GRUPO:

8 ° B

LUGAR Y FECHA:

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS. 19 DE MARZO DEL 2023

hemorragia obstetrica, triaje obstetrico, datos de bajo gisto

Requisitos minimos en expediente clinico, Ingres, Hctina, evolucion

En el embarazo

• Tiempos

• Qs

• BH

• RH.

Control Prenatal.

Se control prenatal debe comenzar en el momento que la mujer sabe que esta embarazada.

- Las consultas deben ser realizadas 1 vez por mes hasta la semana 28 de embarazo, de 15 e 15 dias de la semana 28 hasta la 36 y semanalmente desde la semana 37 de embarazo

Se verifican:

Peso

Presión sanguínea.

Edemas

Fondo uterino

Latidos cardiacos fetales

También se evalua si la gestación es de bajo o alto riesgo verificando, enf. cardiacas, diabetes, desnutrición, cancer, Ins renal, alt neurologicos

Exámenes a solicitar.

Ecografía
BH
Prueba combis
Copro
Glucemia
Grupo sanguíneo
VDRL
EGO.

Triada de pediatría

Aspecto

- Tono
- Reactividad
- Consolabilidad
- Mirada
- Llanto / lenguaje

Valorar SNC (oxigenación y perfusión cerebral)



Respiración

- Trabajo respiratorio (retracción o tiraje de tórax, taquicardio)
- Ruidos respiratorios anormales (estridor quejido, distorsión, sibilancias, ronquidos)

Valorar patología respiratoria.

Circulación

- Color de piel
 - Pálidez
 - Lirideces
 - Cutis marmorata
 - Cianosis.

Valorar función cardíaca y perfusión de órganos

CASO CLÍNICO

D M A

scrib

- ▶ Se trata de Recién nacido de 32 semanas por cesárea, femenino el cual cuenta con los siguientes diagnósticos:
- ▶ Recién nacido prematuro de 32 semanas, se trata de recién nacido que cuenta con los siguientes antecedentes de importancia:
- ▶ **APRE:** Producto de la gesta 3 obtenido por vía abdominal secundario a placenta previa. A:1 P:1 C:1, madre de 26 años de edad la cual llevo control prenatal, 5 consultas en su centro de salud, con ingesta de vitaminas (ácido fólico y fufc), niega infecciones urinarias y vaginales.
- ▶ **EF:** Se observa producto activo y reactivo a estímulos externos, coloración rosada, cráneo normocéfalo, sin hundimientos ni exostosis, con fontanela anterior de 3 cm normotensa, posterior 1 cm, pupilas isocóricas y normoreflexivas, Párpados íntegros, cavidad nasal permeable, cavidad oral íntegra, paladar íntegro, succión débil, pabellón auricular normoimplantado, cuello cilíndrico, tórax simétrico, con movimientos rítmicos de amplexión y amplexión sin estertores ni sibilancias, precordio rítmico, sin soplos, abdomen globoso con perímetro abdominal de 30 cm con peristalsis normal, ruidos audibles, cordón umbilical ligado sin sangrado y sin infecciones, genitales de acuerdo a sexo y edad gestacional, ano permeable, extremidades íntegras con buen tono, con presencia de reflejos de moro, marcha, babinski, con llenado capilar de 2sg barlow y ortolani negativo.