

**UNIVERSIDAD DEL SURESTE CAMPUS COMITÁN,
LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA**

NOMBRE DEL ALUMNO:

Edman Uriel Morales Aguilar

NOMBRE DEL PROFESOR:

Agenor Abarca Espinosa

NOMBRE DEL TRABAJO:

Cuadro sinóptico

MATERIA:

Medicina paliativa

GRADO Y GRUPO:

6 A

MEDICINA PALIATIVA

PLAN DE CUIDADOS PALIATIVOS

Medios ordinarios

Son útiles, no constituyen una carga desproporcionada.

Medios extraordinarios

Son inadecuadas, constituyen una carga demasiado grave para el beneficio requerido.

Obstinación terapéutica

Medidas desproporcionadas o inútiles y alargan la vida con agonía.

CRITERIOS DE TERMINALIDAD

Enfermedad cardíaca

Síntomas de falla cardíaca congestiva en reposo, falla cardíaca congestiva con síntomas persistentes y con tratamiento.

Enfermedad pulmonar

Disnea incapacitante en reposo con pobre respuesta. Tratamiento: broncodilatadores.

Demencia

Incapacidad para deambular y vestirse sin asistencia, incapacidad para bañarse adecuadamente, incontinencia fecal y urinaria, incapacidad para comunicarse, presencia de complicaciones médicas.

SIDA

Cuenta de CD4+, Carga viral y Enfermedades oportunistas

Enfermedad renal

Depuración de creatinina, Creatinina sérica de >8.0 MG/dl, Uremia y Oliguria 7.0

EVC y coma

Pacientes comatosos, Creatinina sérica >1.5 MG/dl, Edad mayor a 70 años, Disfagia sérica y Neumonía por aspiración.

MANEJO SINTOMÁTICO DEL DOLOR

Dolor no relacionado a cáncer

Experiencia sensorial y emocional no placentera que se asocia a un daño a los tejidos real.

Duración mínima de 3-6 minutos. Persiste más allá de la resolución de la enfermedad subyacente.

Dolor relacionado a cáncer

- En el diagnóstico: 30-45% de los pacientes experimentan dolor moderado a severo
- Cáncer avanzando: 75% de los pacientes presentan dolor
- Antes de morir: más del 80% presentan dolor

MANEJO DEL DOLOR ONCOLÓGICO NO ONCOLÓGICO

Analgesia Adecuada

Prevenir Minimizar Los Efectos Colaterales

Buen uso de los analgésicos opioides y evitar su desvío.

Mantener La Más Alta Calidad De Vida

Utilización adecuada de las drogas adyuvantes y la óptima dosificación del opioide.

Consideraciones Farmacológicas

Escalera analgésica diseñada por la OMS, tiene una eficacia del 76%