

ENFERMEDADES EXOTICAS

Extranjero o procedente de un país o lugares lejanos y percibidos como muy distintos del propio

ENCEFALOPATIA ESPINGOIFORME BOVINA

Enfermedad no propagativa del grupo 1, crónica degenerativa que afecta a los bovinos caracterizada por alteración del SNC

Mal de las Vacas locas

Causada por un prion que es una proteína mas pequeña que el virus

Su distribución geográfica se ve en EU, Canadá Brasil y mayoría de países europeos

Se transmite cuando bovinos consumen alimento elaborado con harinas de carne y hueso procedentes de rumiantes infectados

SIGNOS CLÍNICOS DEL SNC

- Temor
- Nerviosismo
- Agresividad
- temblor muscular
- Pérdida de peso
- disminución de la producción láctea
- Dificultad para levantarse
- Fonofobia

CLINICA

- Lengüeteo del moro
- Sialorrea
- Alteración del ritmo cardiaco
- Rechinar dientes
- Pérdida de condición corporal

El Dx definitivo se realiza en el laboratorio

Evitar proporcionar a los bovinos alimentos para cerdos, aves o animales de compañía

Fortalece las buenas prácticas de fabricación de los alimentos destinados a los bovinos

En nuestro país no se han presentado casos

Muerte de bovinos 2 meses después de comienzo de signos

FIEBRE AFTOSA

Enfermedad Viral altamente contagiosa y afecta a bovinos, caprinos y porcinos, búfalos, ciervos y jabalíes

ETIOLOGIA

Virus del género Aphthovirus de la familia picornaviridae

Posee siete tipos inmunológicamente distinto

- A
- O
- C
- SAT 1
- SAT 2
- SAT 3
- Asia 1

Distribución geográfica

Algunos países de Sudamérica, Asia y África

CLINICA BOVINOS

- Vesículas y erosiones
- Fiebre
- Depresión
- Falta de apetito
- Disminución de la producción láctea
- Ulceras en lengua y pezuña

TRANSMISION

- Por aire espirado
- Saliva
- Leche
- Semen
- Orina
- Heces
- Líquido vesicular

CONTACTO DIRECTO

- Fómites
- Personas
- Vehículos
- Material y equipo
- Aire

PORCIONOS

- Muestran mismos signos, aunque menos evidentes
- Erosiones son más graves y dolorosas
- No pueden mantenerse de pie

OVINOS Y CAPRINOS

- Signos pasan desapercibidos
- Animales jóvenes pueden morir por insuficiencia cardíaca

DIFERENCIALES


- Enf. Vesicular del cerdo
- Ectima contagiosa
- Lengua azul
- Diarrea viral bovina
- Estomatitis vesicular

PREVENCION

Fortalecer medidas de bioseguridad en unidades de producción pecuaria

MIOSIS POR GUSANO BARRENADOR

Infestación producida por larvas de mosca que se alimentan de tejido vivo de mamíferos y rara vez de aves



INFLUENZA AVIAR DE ALTA PATOGENICIDAD

Enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a las aves de corral, guajolotes, gallos, gallinas, pollos y codornices. Caracterizado por provocar coloración purpura o amoratada en la cresta y barbilla de las aves afectadas

ETIOLOGIA

Causada por virus del genero Influenzavirus A de la familia Orthomyxoviridae

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

- Países de América
- Europa
- Asia
- África

TRANSMISIÓN

- Aire expirado
- Saliva
- Flujo nasal
- Heces
- Fómites
- Personas
- Vehículos
- Vectores como moscas

DIAGNOSTICO

Por laboratorio

CLINICA

- Inflamación de coloración purpura o amoratada en de la cresta y barbilla
- Fiebre
- Depresión
- Amortamiento
- Falta de apetito
- Estornudos
- Descarga nasal sanguinolenta
- Debilidad
- Diarrea
- Temblores
- Plumaje erizado

DIFERENCIALES

- Bronquitis infecciosa'
- Colera aviar
- Coriza infeccioso
- Colibacilosis
- Sx de baja postura

PREVENCION

Engloba mas que nada toda la sanidad de quipos, material, medidas de bioseguridad en UPA