



Arguello Tovar Avilene Del Rocío

Dr. Abarca Espinosa Agenor

Medicina Paliativa

6° B

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez Chiapas a 17 de Marzo del 2023

Medicina Paliativa

20 - Febrero - 2023

Medicina Paliativa

Dr. Agenor Abarca Espinosa

Cuidados Paliativos >>

PALLIU = Proteger / cubrir (mitigar)

Antecedentes históricos ①

- 372 - Se da la hospedaje de forma caritativa
- 1842 - Primer uso de la palabra Hospice - Lyon, Francia
- 1899 - Fundación del Calvary Hospital por Anne Blunt Storer, NY.
- 1948 - Protestant Homes abren sus puertas para enfermos de tuberculosis y cáncer - Londres.
- 1961 - Nace la fundación St Christopher Hospice, Londres.
Fundadora: Cicely Saunders. / Control de síntomas y acompañamiento espiritual y emocional
- Años 80 - España, Desarrollo de la medicina Paliativa. Otras formas de cuidado son posibles.
- 1980 - Se adopta el término Cuidados Paliativos por la OMS
- 1987 - Se reconoce a la Medicina Paliativa como especialidad médica.
- 1995 - La OPS reconoce el término de Cuidados Paliativos.

Cuidados Paliativos en México. (1970 - 1980)

1. Programas locales e institucionales

1972 - INCMNSZ


1976 - HGM Dr. Edoardo Liceaga

1981 - INCan (Instituto Nacional de Cancerología)

1990 - Se reconocen formalmente como tema de salud pública y de política oficial para el alivio del dolor por cáncer.

2009 - Se incorporan dentro de la legislación Federal. Regulación de los Cuidados Paliativos a los Enfermos en situación terminal.

OPS





Paracetamol

Esquema analgesico


1. Debe contar con una dosis de "rescate".
2. El cálculo del rescate debe ser aproximadamente 10% de la dosis diaria total.

10 mg 6 hrs
 40 mg 24 hrs

Vías de administración:

1. Vía intravenosa → Ruta viable en px hospitalizado.
2. Vía subcutánea → 2da vía
- 3.

Contraindicación de vías parenterales:



Manejo de efectos secundarios

Nauseas y vómitos ✓

⊙ Desequilibrio electrolítico → Labs.
 Electrolitos séricos

→ Estrategias terapéuticas:

1) Medidas Higienico-Dietéticas.

{ Blanda - Infusiones.
 Fraccionada
 Predominio de líquidos

Tratamiento: ① Dimenhidrinato

② Haloperidol

③ Metoclopramide (prokinético)

④ Domperidona

⑤ Escopolamina.

Inducidos por quimioterapia:

1. Ondansetron
2. Dexametasona
3. Lorazepam.
4. Haloperidol
5. Metoclopramida
6. Se pueden combinar los primeros tres fármacos.