

Brenda Nataly Galindo Villarreal

catedrático: Agenor Abarca Espinosa

Nombre del trabajo: Mapa Conceptual

Medicina paliativa


Grado: 6to Semestre

Grupo: "B"

Carrera: Medicina Humana

DELIRIUM

Es un SX cerebral orgánico agudo, caracterizado por un deterioro global de las funciones cognitivas, depresión del nivel de conciencia, trastornos de la atención e increment o disminución de la ctividad motora



Se presenta en aprox el 80% de los pacientes termianeles

durante la última semana de vida se estima un incremento (80% a 95%): agitación o delirium terminal

Factores de Riesgo

presentación clínica

Delirium Hiperactivo:

Diferenciales

suprevalencia en el curso de la nefermedad varia entre el 10% y el 27%

Entre un 30% y un 67% de los episodios de delirium son irreversibles

enfermedad avanzada

deshidratación

deterioro cognitivo previo

Varía desde el px con una importante agitación psicomotriz hasta aquel en situaciones letárgicas o hipoactiva

Prenominan síntomas de agitación psicomotora y conductual

se caracteriza por un estado de somnolencia, pasividad y confusión

Delirium Mixto:

Alternan síntomas de ambos tipos de delirium

debe presentarse una cuidadosa atención a los diagnósticos:

- Demencia

- Depresión

