

ASCITIS

Signos y síntomas


Distensión abdominal
Onda ascítica
Hepatomegalia
Esplenomegalia
Angiomas aracniformes
Eritema palmar
Ginecomastia
Edema periférico



La ascitis es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, causada por una amplia variedad de afecciones

Causas

- Hipertensión portal (por cirrosis hepática)
Carcinomatosis
- Insuficiencia cardíaca



Fisiopatología

- Aumento por presión hidrostática capilar
 - Decremento presión osmótica
 - Saturación sistema reabsortivo

Clasificación por características

Quiloso: Líquido blanquecino y lechoso, señala la presencia de triglicéridos con concentraciones >200 mg/dl

Hemorrágicos: Indicativo de paracentesis traumática o neoplasias.


Estadios

- Grado 1. Ascitis leve, detectada solamente por ultrasonido.
- Grado 2. Ascitis moderada, manifestada con distensión abdominal.
- Grado 3. Ascitis severa, se encuentra distensión abdominal marcada o a tensión

Biliar: Líquido de color pardo oscuro, debido a gran concentración de bilirrubina

Diagnostico

- Paracentesis
- SAAG



Tratamiento

- Reducir sal 2 g día
- Espironolactona y furosemida 100/40 mg , gradual 400/160