



**Nombre del alumno: Dara Pamela Muñoz
Martínez**

Nombre del profesor: Jesús Eduardo Cruz

**Nombre del trabajo: Principales
antihipertensivos**

Materia: Clínicas Medicas Complementarias

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: Sexto semestre

Comitán de Domínguez Chiapas a 13 de marzo del 2023


MEDICAMENTO	NOMBRE	PRESENTACIÓN	DOSIS
	Losartán /Hidroclorotiazida	Gragea o comprimido recubierto	Inicial: 50 mg/12.5 mg día Máx.: 100 mg/ 25 mg día
	Telmisartán/hidroclorotiazida	Tableta o capsula Cada Tableta o cápsula contiene: Telmisartán 80.0 mg Hidroclorotiazida 12.5 mg Envase con 14 Tabletas o cápsulas.	Inicial: 40 mg/12.5 día o 80 mg/ 12.5 día Máx.: 80/25 mg día
	Candesartán/Hidroclorotiazida	Tableta Cada Tableta contiene: Candesartán Cilexetilo 16.0 mg Hidroclorotiazida 12.5 mg Envase con 28 tabletas	Inicial: 8/12,5 mg al día o 16/12,5 mg al día o 32/12,5 mg al día o 32/25 mg al día.
	Irbesartán/Amlodipino	Tableta Cada Tableta contiene: Irbesartán 300 mg Besilato de amlodipino equivalente a 5 mg de amlodipino Envase con 28 Tabletas	150/5 mg o 150/10 mg o 300/5 mg o 300/10 mg, 1 comp./día

	Perindopril/Amlodipino	Comprimido Cada comprimido contiene: Perindopril arginina 10 mg. Amlodipino 10 mg. Frasco con 30 comprimidos.	Dosis recomendada: 3,5 mg/2,5 mg/día. Si no está controlada la presión arterial después de 4 sem, se puede aumentar a 7 mg/5 mg/día.
	Perindopril/Indapamida	Comprimidos Perindopril arginina 5 mg. Indapamida 1.25 mg. Caja con 30 comprimidos. Cada comprimido contiene: Perindopril arginina 10 mg. Indapamida 2.5 mg. Caja con 30 comprimidos.	2 mg/0,625 /día o 4 mg/1,25 mg/día o 8 mg/2,5 mg/día en una toma única. Ancianos: iniciar con 2/0,625 mg/día. I.R. moderada (Clcr 30-60 ml/min); máx. 2/0,625 mg/día.
	Irbesartán/hidroclorotiazida	Tableta Cada Tableta contiene: Irbesartán 300 mg Hidroclorotiazida 12.5 mg Envase con 28 Tabletetas.	150/12,5 mg al día ó 300/12,5 mg al día ó 300/25 mg al día. Máx. 300/25 mg al día.
	Olmesartán/Amlodipino	Tableta Cada tableta contiene: Olmesartan medoxomilo 20 mg. Besilato o de amlodipino equivalente a 5 mg de amlodipino Envase con 28 tabletetas. Tableta Cada tableta contiene:	

		Olmesartan medoxomilo 40 mg. Besilato o de amlodipino equivalente a 5 mg de amlodipino Envase con 28 tabletas.	
	Olmesartán/Hidroclorotiazida	Tableta Cada tableta contiene: Olmesartan medoxomilo 40 mg. Hidroclorotiazida 12.5 mg. Envase con 28 tabletas Cada tableta contiene: Olmesartan medoxomilo 40 mg. Hidroclorotiazida 25 mg. Envase con 28 tabletas	Olmesartán/hidroclorotiazida. Ads.: 20/12,5 mg al día ó 20/25 mg al día ó 40/12,5 mg al día ó 40 mg/25 mg al día.
	Perindopril/Amlodipino/Indapamida	Comprimidos Cada comprimido contiene: Perindopril arginina 5 mg. Besilato de amlodipino 5 mg. Indapamida 1.25 mg. Caja con 30 comprimidos. Cada comprimido contiene: Perindopril arginina 10 mg. Besilato de amlodipino 5 mg. Indapamida 2.5 mg. Caja con 30 comprimidos.	5 mg/1.25 mg/5 mg día

	<p>Amlodipino/ Valsartán/ Hidroclorotiazida</p>	<p>Comprimido Cada Comprimido contiene: Besilato de Amlodipino equivalente a 5 mg de Amlodipino Valsartán 160 mg Hidroclorotiazida 12.5 mg Envase con 28 Comprimidos</p>	<p>5/160/12,5 mg al día ó 5/160/25 mg al día ó 10/160/12,5 mg al día ó 10/160/25 mg al día, administrar con o sin alimentos, cada día a la misma hora y preferentemente por la mañana</p>
	<p>Olmesartán/ Amlodipino/ Hidroclorotiazida</p>	<p>Tableta. Cada tableta contiene: Olmesartán medoxomilo: 40 mg Besilato de amlodipino: 10 mg Hidroclorotiazida: 25 mg Caja con 28 tabletas</p>	<p>20/5/12,5 mg al día en pacientes cuya presión arterial no está controlada con 20 mg de olmesartán medoxomilo y 5 mg de amlodipino tomados como combinación doble; ó 40/5/12,5 mg al día en pacientes cuya presión arterial no está controlada con 40 mg de olmesartán medoxomilo y 5 mg de amlodipino tomados como combinación doble</p>

	Espironolactona	Tableta Cada Tableta contiene: Espironolactona 100 mg Envase con 30 Tabletas.	25 a 200 mg cada 8 horas.
	Furosemida	Tableta Cada tableta contiene: Furosemida 40 mg Envase con 20 tabletas	20 mg al día 2 a 3 tomas según patología
	Captopril	Tableta Cada tableta contiene: Captopril 25 mg. Envase con 30 tabletas	Inicial: 25-50 mg/día en 2 tomas. Aumento gradual a intervalos mínimo de 2 sem hasta 100-150 mg/día (2 tomas)
	Enalapril Lisinopril Ramipril	Cápsula o tableta Cada cápsula o tableta contiene: Maleato de enalapril 10 mg. O Lisinopril 10 mg. O Ramipril 10 mg. Envase con 30 cápsulas o tabletas	5-20 mg/día; con sistema renina- angiotensina- aldosterona muy activo: 5 mg o menos. Mantenimiento: 20 mg/día; máx. 40 mg/día. 10 mg/día, con sistema renina- angiotensina- aldosterona activado: 2,5-5 mg; mantenimiento: 20 mg/día; máx. 80 mg/día. Inicial 1,25-2,5 mg/día;

			<p>mantenimiento: 2,5-5 mg/día; máx.10 mg/día. - Prevención cardiovascular: inicial 2,5 mg/día, duplicar cada 1-2 sem hasta dosis de mantenimiento: 10 mg/día.</p>
	<p>Losartán</p>	<p>Gragea o comprimido recubierto. Cada gragea o comprimido recubierto contiene: Losartán potásico 50 mg. Envase con 30 grageas o comprimidos recubiertos.</p>	<p>50 mg/día; máx. 100 mg/día (por la mañana)</p>
	<p>Telmisartán</p>	<p>Tableta Cada Tableta contiene: Telmisartán 40 mg Envase con 30 Tabletas.</p>	<p>HTA esencial: 40 mg/día. Ajustar dosis: 20-80 mg/día; máx. 80 mg/día. Efecto máx. se alcanza a las 4-8 sem.</p>
	<p>Valsartán</p>	<p>Comprimido Cada Comprimido contiene 80 mg Envase con 30 Comprimidos</p>	<p>Adultos: 80 mg/día. Si no se obtiene control, incrementar a 160 mg/día; máx. 320 mg.</p>
	<p>Amlodipino</p>	<p>Tableta o capsula Cada tableta o cápsula contiene: Besilato o Maleato de amlodipino equivalente a</p>	<p>Inicial 5 mg/día; aumentar hasta un máx. 10 mg/día (como única dosis) según respuesta individual.</p>

		<p>5mg de amlodipino. Envase con 10 tabletas o cápsulas. Tableta o capsula Cada tableta o cápsula contiene: Besilato o maleato de amlodipino Equivalente a 10 mg de amlodipino. Envase con 14 tabletas o cápsulas.</p>	
	<p>Nifedipino</p>	<p>Comprimido de Libерación prolongada Cada comprimido contiene: Nifedipino 30 mg. Envase con 30 comprimidos</p>	<p>30 mg al día</p>
	<p>Felodipino</p>	<p>Tableta de liberación prolongada Cada tableta contiene: Felodipino 5 mg. Envase con 10 tabletas de liberación prolongada.</p>	<p>5 mg/1 vez al día. Dependiendo de la respuesta, si procede, la dosis se puede disminuir a 2,5 mg o aumentar a 10 mg al día.</p>
	<p>Verapamilo</p>	<p>Gragea o tableta Recubierta Cada gragea o tableta recubierta contiene: Clorhidrato de verapamilo 80 mg. Envase con 20 grageas</p>	<p>240mg/día. Si es necesario aumentar, después de una semana, a 360 mg/día, hasta máximo 480 mg/día.</p>

	<p>Prazosina</p>	<p>Cápsula o comprimido Cada cápsula o comprimido contiene: Clorhidrato de prazosina equivalente a 1 mg de prazosina. Envase con 30 cápsulas o comprimidos.</p>	<p>Monoterapia: inicial: 0,5 mg/2 veces al día (1ª dosis junto la cena), durante 4 días, aumentar a 1 mg/2 veces al día los 4 días siguientes, monitorizar presión arterial y ajustar dosis; mantenimiento: 3-20 mg/día (repartido en 2 tomas con las comidas).</p>
	<p>Metoprolol</p>	<p>Tableta Cada tableta contiene: Tartrato de metoprolol 100 mg. Envase con 20 tabletas</p>	<p>50-100 mg/12 h ó 100-200 mg/día; retard: 47,5-95 mg de metoprolol succinato (50-100 mg de metoprolol tartrato) una vez al día.</p>