

## Francisco Javier Pérez López

## DR. Cruz Domínguez Jesús Eduardo

"Antihipertensivos"

Materia: clínicas medicas complementarias

Grado: 7° semestre

## **ANTIHIPERTENSIVOS**

FÁRMACOS	Presentación	Dosis	Efecto
CLORTALIDONA (DIURÉTICO TIAZIDICO)	Tableta de 50 mg	VO: inicio 15 mg/día se pude incrementar hasta 30 mg/día	Inicia efecto en 2-6 horas, vida media de 50 horas.
LOSARTAN (ARA II)	Tabletas de 12.5 mg 50 mg 100 mg	VO: inicio de 50 mg/día, mantenimiento de 25-100 mg en 1-2 dosis divididas.	Inicia efecto en 6 horas, vida media de 2 horas
IRBESARTAN (ARA II)	Tabletas de 75 mg 150 mg 300 mg	VO: 150 mg/día (inicial), 300 mg/ día (mantenimiento)	Inicia efecto en 1-2 horas, vida media de 12 horas.
CAPTOPRIL (IECA)	Tabletas de 25 mg 50 mg 100 mg	VO: adultos 50 mg día (inicial), 100 mg día (mantenimiento)	Inicia efecto en 20 minutos, vida media de 2 horas
NIFEDIPINO (CALCIOANTAGONISTA DIHIDROPIRIDINICOS)	Tabletas de 20 mg 30 mg Capsulas de 10 mg	VO: 30-60 mg/día	Inicia efecto en 20-30 minutos, vida media de 3-5 horas.
VERAPAMILO (CALCIOANTAGONISTA NO DIHIDROPIRIDINICOS)	Tabletas de 80 mg 120 mg 180 mg So. Iny. 5 mg/2 ml	VO: 120 mg-240 mg/día (inicial) 240-360 mg/día (mantenimiento)	Inicia efecto en 1-5 minutos (IV) en 1-2 horas (VO), vida media de 3-5 horas.
LABETALOL (BETA BLOQUEADOR)	Tabletas de 100 mg 200 mg Inyectable de 100 mg/ 20 ml	VO: 100 mg/12 horas o 200-400 mg/12 horas. IV: bolo de 20-80 mg.	Inicia efecto en 20 minutos, vida media de 2.5-8 horas
METOPROLOL (BETA BLOQUEADOR)	Tabletas de 100 mg 200 mg Inyectable de 1mg/ml	VO: 100 mg/día (inicial), 100-450 mg/día (mantenimiento) IV: 1.25-5 mg/3-6 horas	Inicia efecto en 1-2 horas, vida media de 4-6 horas
PROPANOLOL	Tabletas de 10 mg 40 mg Inyectable de	VO: 40 mg/12 horas (inicial), 160-480 mg/día/2-3 dosis	Inicia efecto en 1-2 horas, vida media de 4-6 horas.

	1 mg/ml		
HIDRALAZINA	Tabletas de 25 mg 50 mg Inyectable de 20 mg/ml	VO: 10-25 mg/6 horas, dosis máxima 300 mg/día VI: bolo de 10-20 mg	Inicia efecto a los 20-30 minutos, vida media 3-7 horas.
FUROSEMIDA (DIURÉTICO DE ASA)	Tabletas de 40 mg Sol. Iny. 20 mg/ 20 ml	VO: Adultos: inicial de 40 mg 2 veces al día. Dosis máxima: 600 mg/día. Niños: 1-2 mg/kg/6 horas	Inicia efecto en 30-60 minutos, vida media de 30- 100 minutos.