



Erika Patricia Altuzar Gordillo

Jesús Eduardo Cruz Domínguez.

Hipertensivos.

Clínicas medicas complementarias.

7° semestre

Comitán de Domínguez Chiapas a 13 de Marzo o del 2023

Farmaco.	Presentación	Farmacodinamia.	Contraindicaciones	Dosis.	Indicaciones terapéuticas.
Captopril.	Comprimidos 25mg 50mg	Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina.	Hipersensibilidad. Antecedentes de Angioedema. Edema orognoteatrico.	25-50 mg/día en 2 dosis.	Hipertensión. Insuficiencia cardíaca
Enalapril.	Comprimidos 10, 20 mg.	Inhibición del sistema renina-Angiotensina-Aldosterona.	Tos. Mareos. Dolor de cabeza. Cansancio excesivo. Calambres musculares. ↓ de la capacidad sexual. Hipersensibilidad. Angioedema	Inicio 0,04-0,4 mg/kg/día. Comenzar con la dosis más baja y aumentando cada pocos días.	Hipertensión. Insuficiencia cardíaca Síntomas.
Lisinopril.	Comprimidos de 10, 20, 5 mg.	Inhibición del sistema renina-Angiotensina-Aldosterona.	Hipersensibilidad. Angioedema	Dosis habitual recomendada es de 10mg.	Presión Arterial Alta Insuficiencia Cardíaca
Quinapril.	Comprimidos de 5mg, 20 mg.	Demarción de la ECA circulante: No afecta la respuesta angiotensina II.	Mareos. Cansancio excesivo. Tos. Malestar estomacal. Vómitos.	Dosis habitual recomendada es de 10mg.	Hipertensión Arterial esencial.
Ramipril.	Comprimidos de 2,5mg, 5mg	Sustituto de la enzima de conversión de la angiotensina, bloqueando su conversión a angiotensina II.	Cefalea. Tos. Mareos. Vómitos. Malestar estomacal. Cansancio excesivo. Debilidad.	Debe iniciarse a una dosis de 1,25mg. Se debe vigilar la función renal y el potasio sérico.	Para reducción de la presión arterial en la hipertensión. Insuficiencia cardíaca postenfermedad de miocardio.
Trandolapril.	Comprimidos de 2mg	Bloqueante de la reninación de angiotensina I a angiotensina II.	Inflamación de Oza, garganta, lengua, labios, ojos, manos, pies. Ronquera. Dificultad para respirar. Tos.	Dosis inicial recomendada es de 0,5 mg o 1mg y hasta 2mg diarios toma única.	Hipertensión. Insuficiencia Cardíaca después de un ataque cardíaco.
Perindopril.	Comprimidos de 4-8 mg.	Inhibidor de la enzima que transforma la angiotensina I en II.	Cefalea. Diarrea. Debilidad. Mareos. Dolor de estómago. Malestar estomacal.	Dosis recomendada es de 4 mg administrados una vez al día por la mañana.	Hipertensión. Insuficiencia Cardíaca. Enfermedad coronaria estable.
Fosinopril.	Comprimidos 10, 12, 20 mg 8	Impide la conversión de angiotensina I a la sustancia vasoconstrictora angiotensina II.	Mareos. Cansancio excesivo. Tos. Malestar estomacal. Vómitos. Diarrea. Cefalea. Debilidad.	Dosis recomendada es de 10 mg una vez al día.	Hipertensión