



**MÉTODOS, INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE DIAGNOSTICO VETERINARIO
MATERIA**

**3°B
CUATRIMESTRE**

**M.V.Z. BARRERA ROBERTO GARCÍA SEDANO
MEDICO**

**EXAMEN FÍSICO DE BORREGOS
TEMA**

**ANGEL ARMANDO HERNÁNDEZ GÓMEZ
ALUMNO**

**LIC. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
LICENCIATURA**

EXAMEN CLINICO

borreagos



EXAMEN FISICO

1. Comienza con la condición corporal y la actitud.
2. La palpación digital de los nódulos linfáticos intermandibular, parotídeo, retro faríngeo, prescapular, prefemoral y supramamario. Anota que diferencias encuentre en esas estructuras, las anomalías evidentes deben ser escritas en la tarjeta de identificación si esta no ha sido notificada.
3. Toma cinco mediciones: frecuencia respiratoria, pulso, temperatura, coloración de las membranas mucosas y movimientos ruminales. Y revisa la piel siendo enumerada como una sexta medición para fines de esta práctica.



Frecuencia respiratoria: Se observa el número de movimientos torácicos por minuto o se utiliza un estetoscopio para escuchar las respiraciones. En adultos es de 10 a 30/minuto en animales en reposo y en cabritos es de 20 a 50/min.

Temperatura: Inserta el termómetro a través del ano al recto en dirección a la pared del mismo. El parámetro es de 38 a 40.6°C, el promedio es de 39.3°C.

Frecuencia cardiaca o pulso: Se determina colocando el estetoscopio entre el esternón y el codo izquierdo del animal y se cuentan los latidos cardiacos. También se puede medir colocando el dedo índice sobre la arteria femoral, en la cara interna del muslo. El parámetro es de 60 a 95/min en animales en reposo.

Temperatura
38-40 °C

Frecuencia Respiratoria
10-30 rpm

Frecuencia Cardiaca
80-120 lpm

Gestación
152 días



Mucosas: Se presionan los párpados del ojo para protruir las membranas mucosas. También es observable la mucosa vulvar. Si se encuentran pálidas el animal presenta anemia, si se encuentran amarillas es probable un problema hepático.

Movimientos ruminales: Se coloca firmemente la mano en la depresión del ijar izquierdo (detrás de la última costilla) y se deja por dos minutos. El número de movimientos es de 1 a 2 por minuto

Movimientos ruminales: Se coloca firmemente la mano en la depresión del ijar izquierdo (detrás de la última costilla) y se deja por dos minutos. El número de movimientos es de 1 a 2 por minuto



<https://archivos.ujat.mx/2013/daca/manuales-LMVZ/F1132%20Manual%20de%20Practic as%20Clinica%20de%20Ovinos%20y%20 Caprinos.pdf>

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fcorderosupremo.com%2Fbocadillos%2Fmuerte-por-anemia&psig=AOvVaw0G_Lj-7XkL2TwnpJn-sTo6&ust=1686274768588000&source=images&cd=vfe&ved=0CBEQjRxqFwoTCNCU6ZbFsv8CFQAAAAAdAAA AABA v

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.argentina.gob.ar%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fimg-20220706-wa0017.jpg&tbnid=RGmnvI9fLzxCtM&vet=12ahUKEwiUqvXjqbX_AhXMmYQIHUh1CcEQMygOegUIARCIAQ..i&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.argentina.gob.ar%2Fsenasa%2Fs indromes-que-afectan-los-pequenos-rumiantes-ovinoscaprinos&docid=ft2aqgSg8sMTFM&w=640&h=429&q=mucosas%20borregos&ved=2ahUKEwiUqvXjqbX_AhXMmYQIHUh1CcEQMygOegUIARCIAQ