



Mi Universidad

Karina Mendoza Cruz

**Lic.: Olga Carolina Montero
Reyes.**

Patología del Adulto.

09/06/23

RIESGO DE CONTRAER EL HEPATITIS A

- personas que tienen relación sexual con la persona infectada.
- drogas ilegales.
- hombre que tiene relación sexual con el mismo sexo.



SINTOMAS

- diarrea.
- fatiga.
- náuseas, vómitos.
- dolor abdominal.

hepatitis A


Infección aguda, o de corta duración.

DIAGNOSTICO

- historial médico.
- examen físico.
- análisis de sangre.

PREVENCIÓN

Vacuna contra el hepatitis a.




CAUSAS

- el virus se transmite a través del contacto con las heces.
- beber agua contaminada.
- Contacto con persona que tiene hepatitis a.

TRATAMIENTO

- descansar.
- tomar muchos líquidos.
- alimentos saludables.



RIESGO DE CONTRAER EL HEPATITIS B


- cualquier persona lo puede contraer.
- Trabajadores de salud.
- Relaciones sexuales.
- Personas con diabetes.

SINTOMAS

- diarrea.
- fatiga.
- náuseas y vómito.

hepatitis B

Infección aguda a corto plazo o crónica a largo plazo.



DIAGNOSTICO

- exame físico.
- Historial médico.
- Análisis de sangre.



CAUSAS

- a través del contacto directo con sangre.
- semen.
- fluidos corporales.

TRATAMIENTO

medicamentos antiviral.

PREVENCIÓN

- no compartir agujas.
- usar guantes
- usar condón.

La hepatitis Puede ser:
Aguda.
Cronica.





Como se propaga por :

- Compartir agujas o materiales.
- Tener contacto con heridas o sangre.
- Pinchazo con agujas.

hepatitis c

es la inflamación del hígado. Inflamación es la hinchazón de órganos.



Síntomas

- Fiebre.
- Fatiga.
- Dolor abdominal.

Tratamiento

Medicamentos antivirales.