



**Mi Universidad**

## **TRIPTICO**

*Nombre del Alumno: MARIA GUADALUPE PEREZ PEREZ*

*Nombre del tema: ANTIHIPERTENCIVOS*

*Parcial: 3 PARCIAL*

*Nombre de la Materia: FARMACOLOGIA*

*Nombre del profesor: CECILIA DE LA CRUZ SANCHEZ*

*Nombre de la Licenciatura: LICENCIATURA EN ENFERMERIA*

*Cuatrimestre: 3 CUATRIMESTRE*

# FARMACOS ANTIHIPERTENSIVOS




antihipertensivos comercializados hoy día, y finalmente se concluye con una serie de criterios generales de uso para una correcta terapia antihipertensiva.

## Beta-bloqueadores:

- Cardioselectivos 5-100

### ATENOLOL

- BISOPROLOL 5-10
- CELIPROLOL 200-400
- METOPROLOL 50-200
- NEBIVOLOL 2,5-5



## IECA:

- BENAZEPRIL 10-40 1-2
- CAPTOPRIL 25-150 2-3
- CILAZAPRIL 1,25-5 1
- DELAPRIL 30-120 2
- ENALAPRIL 5-40 1-2



## ARA-II:

- CANDESARTAN 4-16
- EPROSARTAN 600-800
- IRBESARTAN 75-300
- LOSARTAN 25-100



<https://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-articulo-antihipertensivos-13079693>

@sitioincreible


(55) 1234-5678

www.sitioincreible.com



Lo que necesitas saber


# ANTIHIPERTENSIVOS




# ¿QUÉ SON LOS ANTIHIPERTENSIVOS?




Los antihipertensivos son un grupo de medicamentos utilizados para normalizar una tensión arterial anormalmente alta. Tienen unos mecanismos de acción muy variados.




Entre los antihipertensivos encontramos los diuréticos, los inhibidores de la enzima de conversión, los antagonistas de la angiotensina II, los inhibidores cálcicos, los vasodilatadores arteriales centrales o periféricos y los betabloqueantes



A veces se puede prescribir una combinación de dos fármacos antihipertensivos. El tratamiento debe ser seguido a largo plazo. Es necesario un seguimiento regular de la presión arterial y del ECG para verificar la eficacia del tratamiento.



## OBJETIVOS



### ✓ control testional

disminuir las cifras, sino obtener el control tensional, es decir, valores inferiores a 140/90 mmHg o menores si se trata de pacientes diabéticos o con otros factores de riesgo.

### ✓ tratamiento

se inicia con recomendaciones para modificar hábitos de vida, pero casi todos los pacientes hipertensos reciben también tratamiento farmacológico, además del higienicodietético.

### ✓ clases de farmacos

son apropiadas para el inicio y el mantenimiento del tratamiento antihipertensivo



### ✓ control testional

hay un aspecto importantísimo, que es el cumplimiento del paciente. Sólo si se sigue de forma adecuada el tratamiento, farmacológico y no farmacológico, será posible alcanzar el objetivo terapéutico.

