



Cuadro Sinóptico

Nombre del Alumno: Ingrid Villarreal Sanchez

Nombre del tema: Tipos de hemorroides

Parcial: 3er.

Nombre de la Materia: enfermería gerontogeriatrica

Nombre del profesor: Cecilia de la cruz Sanchez

Nombre de la Licenciatura: enfermería

Cuatrimestre: 6to.

Tipos de hemorroides

Hemorroides interna



Se hallan cerca de la línea dentada, recubiertas por mucosa ano rectal insensible.

Las hemorroides internas se dividen en 4


Grado I: Abultan el conducto anal, pueden prolapsarse por debajo de la línea dentada con esfuerzos

Grado II: Se prolapsan por el canal anal durante el esfuerzo, pero se reducen de manera espontánea

Grado III: Se prolapsan durante el esfuerzo y solo se reducen de forma manual

Grado IV: Se prolapsan pero no pueden reducirse y tienen riesgo de estrangularse

Hemorroides externas



Las Hemorroides Externas o colgajos cutáneos son aquellas que se desarrollan en forma distal en el área circundante del ano y se encuentran cubiertas por piel muy sensible, rara vez presentan dolor, sangrado u otros síntomas.

Causas:

Las hemorroides pueden ser causadas por una gran variedad de razones la causa o el principal factor es algún tipo de esfuerzo.

Signos y síntomas:

Las hemorroides externas rara vez presentan dolor, sangrado u otros síntomas.

Algunos pacientes presentan la sensación de un cuerpo extraño en la región perineal o pueden presentar molestias por colgajos muy grandes que dificultan la higiene o predisponen a la inflamación y prurito.

Diagnostico:

Se realiza una revisión de la piel perineal, un examen rectal y se observa el interior del conducto anal, donde se utiliza un instrumento corto especializado con una luz llamado anoscopio para poder observar las hemorroides internas.

Tratamiento:

- Uso de Cremas y Supositorios puede aliviar la inflamación
- Baños de asiento durante 10-15 minutos 4-5 veces al día para aliviar el dolor más agudo.
- Uso de Medicamentos como los analgésicos para aliviar la inflamación y el dolor. Estos deben administrarse en

Tratamientos QX

Grado III	• Hemorroides con un prolapso severo. • Que requiere reducción manual (ha fallado un tx en el consultorio).
Grado IV	• Hemorroides que no es posible reducir.
Hemorroides que se complican.	• Una patología asociada.

Factores de riesgo

Sedentarismo, obesidad, embarazo, bipedestación extrema. Estos factores se relacionan con un aumento de la presión intraabdominal y constipación crónica. Puede haber personas que tengan todos los factores de riesgo y no presenten hemorroides

Manifestaciones clínicas

Internas:

- Hemorragia no dolorosa, intermitente y escasa.
- La sangre es de color rojo brillante.
- Ardor y prurito en región perianal.
- Sensación de cuerpo extraño.
- Anemia (dato muy inusual 0.5 casos x 100,000 px con anemia)

DOLOR
← Exclusivo de Hemorroides EXTERNAS *
Casos de trombosis.