



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Yubitza Ascencio Galera.

Nombre del tema: tipos de pancreatitis.

Parcial: 3°.

Nombre de la Materia: enfermería médico quirúrgica I I.

Nombre del profesor: Cecilia de la Cruz Sánchez.

Nombre de la Licenciatura: enfermería.

Cuatrimestre: 6°.

Lugar y Fecha de elaboración: Pichucalco, Chiapas; a 04 de julio del 2023.

Pancreatitis.

¿Qué es?


Es la inflamación del páncreas. La pancreatitis puede aparecer en su forma aguda, es decir, que aparece repentinamente y dura unos días. Algunas personas pueden desarrollar pancreatitis crónica, que perdura muchos años.



Causas

Aparece cuando las enzimas digestivas se activan cuando todavía se encuentran en el páncreas, lo que irrita las células del páncreas y causa inflamación.

- Cálculos biliares.
- Alcoholismo.
- Ciertos medicamentos.
- Cáncer de páncreas.
- Cirugía abdominal.
- Fibrosis quística.
- Infección.
- Lesión en el abdomen.
- Obesidad.
- Traumatismos.



Diagnóstico

- Análisis de sangre.
- Examen físico.
- Tomografía computarizada.
- Ecografía.
- Resonancia magnética.



Pancreatitis.


Tipos

Pancreatitis aguda.

- Dolor en la parte alta del abdomen.
- Dolor abdominal que se irradia hacia la espalda.
- Sensibilidad al tocar el abdomen.
- Fiebre.
- Pulso acelerado.
- Náuseas.
- Vómitos.

Pancreatitis crónica.

- Dolor en la parte alta del abdomen.
- Dolor abdominal que empeora después de comer.
- Pérdida de peso sin intentarlo.
- Heces aceitosas y con un olor fétido (esteatorrea).



Tratamiento.

Pancreatitis aguda.

El tratamiento para la pancreatitis aguda comúnmente incluye líquidos intravenosos (IV), antibióticos y analgésicos. Un ataque agudo de pancreatitis causado por cálculos biliares puede requerir la extirpación de la vesícula biliar o una cirugía endoscópica del conducto biliar.

Pancreatitis crónica.

Puede incluir líquidos intravenosos, analgésicos, una dieta nutritiva baja en grasas y suplementos enzimáticos. La cirugía puede ayudar a aliviar el dolor abdominal, restaurar el drenaje de las secreciones pancreáticas

Pancreatitis.

Cuidados de enfermería

- Monitorización de signos vitales.
- Valorar la intensidad del dolor (escala EVA) si es posible.
- Observar las expresiones no verbales.
- Reposo en cama hasta que pase la fase aguda del dolor.
- Proporcionar ambiente tranquilo y reparador.
- Mantenga al paciente en la postura que mejor le alivie el dolor.
- Mantener el ambiente libre de olores de alimentos, porque la estimulación sensorial puede activar las enzimas del páncreas, produciendo más dolor.
- Administrar la analgesia pautada.
- Valorar el estado de la piel, en busca de fístulas de la pared abdominal, pues las enzimas pancreáticas pueden dirigirse a la piel y/o tejidos de la pared abdominal provocando quemadura química.
- Limitar y reducir alimentos y líquidos que provoca la liberación de las enzimas pancreáticas, evitando el dolor.
- Preparar al paciente para posible intervención quirúrgica.
- Mantener una vía periférica bien localizada de buen calibre.
- Balance de los líquidos de 24 horas, pérdidas, vómitos, aspiración gástricas o diarrea.

Manejo hospitalario

- Una hospitalización para tratar la deshidratación con líquidos intravenosos (IV) y, si el paciente puede tragarlos, líquidos por la boca.
- Analgésicos y antibióticos por vía oral o por vía intravenosa si el paciente tiene una infección en el páncreas.
- Una dieta baja en grasa o nutrición con alimentación por sonda o IV si el paciente no puede comer.

El médico puede referir al paciente a un gastroenterólogo o cirujano para que reciba uno de los siguientes tratamientos, dependiendo del tipo de pancreatitis que tenga.



<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/pancreatitis/symptoms-causes/syc-20360227>

<https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-digestivas/pancreatitis/tratamiento>