



Mi Universidad

SUPER NOTA

Estrella Marina Villatoro Hernández

Unidad III: Trastorno obsesivo compulsivo, relacionados con traumas y factores de estrés y disociativos

Unidad IV: Trastornos de ansiedad y somáticos

Segundo modulo

Psicopatología I

Lic. Mónica lisseth Quevedo Pérez

Lic. En psicología

Sexto cuatrimestre


Pichucalco, Chiapas a 12 de junio 2023

Los trastornos disociativos se caracterizan por una interrupción y/o discontinuidad en la integración normal de la conciencia.



<https://i1.wp.com/apapachoa.net/wpcontent/uploads/2022/03/chica.jpg?fit=1000%2C647&ssl=1>

Trastorno obsesivo compulsivo, relacionados con traumas y factores de estrés y disociativos.



https://www.psico.mx/site/article/22165/45088/shutterstock-1199941207_ai1.jpg

El TOC se caracteriza por la presencia de obsesiones y/o compulsiones.



<https://nepesa.es/wp-content/uploads/2020/10/NEPSA-TRASTORNO-OBSEIVO-COMPULSIVO-5.jpg>


Trastorno dismórfico corporal

están preocupados por uno o más defectos percibidos en su apariencia física



<https://www.psicohuma.com/blog/wp-content/uploads/2017/03/trastorno-dismorfico.jpg>

Trastorno Obsesivo Compulsivo




El individuo intenta ignorar o suprimir estas obsesiones.

<https://blogs.uninter.edu.mx/ESCAT/wp-content/uploads/2020/11/29e311d38bd15e404a5abeab816e0db5-1-1024x683.jpg>

Trastorno de acumulación

se refiere a cualquier forma de descarte, incluyendo tirar, vender, regalar o reciclar.




https://static.eldiario.es/clip/9eb0ddc44619-4ffa-b38df131d08c9933_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg

Tricotilomanía Es el acto recurrente de arrancarse el propio pelo. Es posible que los sitios donde se producen los tirones de pelo varíen con el tiempo.




<https://psicoterapeutas.com/wp-content/uploads/2021/06/tricotilomania1.jpg>

Los individuos con **trastorno de excoriación** a menudo pasan una cantidad significativa de su tiempo realizando comportamientos de rascado, a veces varias horas al día, y esta excoriación de la piel puede durar meses o años.



<https://mejorconsalud.as.com/wp-content/uploads/2017/12/2Dermatoman%C3%ADa-cuando-la-ansiedad-hiere-la-piel-768x439.jpg>

Trastorno de estrés posttraumático es el desarrollo de síntomas específicos tras la exposición a uno o más eventos traumáticos. Las reacciones emocionales al evento traumático (p. ej., el miedo, la impotencia, el horror)




<https://clinicadeansiedad.com/wp-content/uploads/2022/02/Amenazas.jpg>

Trastorno disociativo no especificado causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento.



Trastorno de apego reactivo se caracteriza por un patrón de conductas de apego notablemente alterado e inadecuado para el desarrollo, en el que el niño claramente recurre a una figura de apego para su comodidad, apoyo, protección y crianza.



https://www.miconsulta.es/wp-content/uploads/2017/07/vinclesnp_eyectache_r.jpg



https://www.familiaysalud.es/sites/default/files/1161_trastorno_aniedad_separacion_infancia.png

Trastorno de ansiedad por separación
La persona con trastornos de ansiedad por separación se encuentra asustada o ansiosa ante la separación de aquellas personas por las que siente apego en un grado que es inapropiado para el desarrollo.

Trastornos de ansiedad y somáticos

Los trastornos de ansiedad son los que comparten características de miedo y ansiedad excesivos.

<https://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2019/02/timidez.png>



Mutismo selectivo
se caracteriza por una incapacidad para hablar en las situaciones sociales en que hay expectativa de hablar (p. ej., en la escuela), a pesar de que la persona habla en otras situaciones.

Síntomas de la ansiedad somatizada

- Tendencia a desarrollar enfermedades como psoriasis o dermatitis
- Nudo en el estómago
- Taquicardia o palpitaciones
- Sensación de opresión en el pecho
- Dolor muscular
- Vértigos
- Náuseas
- Pérdida de la memoria a corto plazo
- Nudo en la garganta
- Gastritis y acidez en el estómago
- Colon irritable
- Sensación de falta de aire



¡El trastorno de ansiedad social no es timidez! Implica un **temor intenso** a ser **examinado de cerca** y **juzgado**.

https://www.nlm.nih.gov/sites/default/files/images/2022_SocialAnxiety_SP_Twitter.jpg

Trastorno de ansiedad generalizada ansiedad persistente y excesiva y una preocupación sobre varios aspectos, como el trabajo, la escuela, etc.



<https://ansiedadystres.org/wp-content/uploads/2022/03/%C2%BFQue-es-el-trastorno-de-ansiedad-generalizada.jpg>

Trastorno de pánico y Agorafobia la persona experimenta recurrentes e inesperadas crisis de pánico y está persistentemente intranquila o preocupada sobre tener nuevas crisis.



<https://www.manuelescudero.com/wp-content/uploads/2020/03/trastorno-de-panico-por-agorafobia.png>

Trastorno de conversión Los síntomas motores son debilidad o parálisis, movimientos anormales, como el temblor o las distonías, alteraciones de la marcha y la postura anormal de los miembros.



<https://www.esalud.com/wp-content/uploads/2022/12/trastorno-de-conversion-que-es.jpg>

¿Qué es el trastorno facticio?

- En estos trastornos, los factores externos pueden estar presentes pero juegan un rol menor en el refuerzo de los síntomas
- La motivación aparece al asumir el rol de enfermo
- Puede incluir la producción de quejas subjetivas
 - Dolor de cabeza
 - Lesiones autoinflingidas
 - Exageración de condiciones médicas preexistentes



Trastorno de ansiedad por enfermedad implica una preocupación por tener o adquirir una enfermedad médica grave no diagnosticada.

<https://www.ivanesalud.com/wp-content/uploads/2018/09/120-hipocondria-en-personas-edad-avanzada.jpg>

UDS ANTOLOGIA PSICOPATOLOGIA I 2023 <https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/biblioteca/7ae150cef92984c78ff1b2e3cbda3790.pdf>