



NOMBRE DEL ALUMNO: Jarumy Azuceli Ortiz López.

TEMA: Problemas hepáticos y biliares.

PARCIAL: 2

MATERIA: Patología del adulto.

NOMBRE DEL PROFESOR: Dra. Guadalupe Clotosinda Escobar Ramírez

LICENCIATURA: En enfermería.

CUATRIMESTRE: 6°

PROBLEMAS HEPATICOS

HEPATITIS

Significa inflamación del hígado

Los tipos más comunes son:

• Hepatitis A

Síntomas

- Fiebre ,Vómitos ,Dolor abdominal, Diarrea y Coloración amarilla en ojos y piel

Prevención

- Vacunación, lavado de alimentos, educación de medidas de higiene.

Vía de transmisión

- Vía fecal-oral

• Hepatitis B

Síntomas

- Dolor abdominal, orina oscura, fiebre, artralgia, náuseas y vómito, fatiga, fiebre.

Transmisión

- Parenteral: exposición a fluidos infectados, sexual y perinatal.

• Hepatitis C

Síntomas

- Se presenta entre las 2 semanas y los 2 meses posteriores de contraer la enfermedad

Transmisión

- Sangre, jeringas contaminadas y vía sexual

CIRROSIS HEPATICA

Es la formación grave de cicatrices en el hígado.

Síntomas

- Cansancio, formación de hematomas, pérdida de apetito, nauseas, prurito, ictericia, somnolencia y confusión.

Causas

- Consumo excesivo de alcohol, hemocromatosis, enfermedad de Wilson, fibrosis quística, mal formación de conducto y síndrome de Alagille.

Factores de riesgo

- Consumir demasiado alcohol, obesidad, padecer hepatitis viral.

Complicaciones

- Presión arterial elevada, hinchazón en piernas y abdomen, sangrado, infecciones, malnutrición, ictericia, etc.

CANCER DE HIGADO

Es un tumor que comienza en las células hepáticas.

Síntomas

- Ictericia en ojos y piel, pérdida de peso, dolor abdominal y náuseas y vómitos.

Factores de riesgo

- Hepatitis B, C., hígado graso, obesidad, diabetes, consumo de alcohol, hemacromatosis, cirrosis.

Diagnostico

- Examen físico, ecografía, análisis de sangre, biopsia hepática, resonancia y tomografía computarizada

PROBLEMAS BILIARES

COLELITIASIS

Es la formación de piedras (cálculos) en el interior de la vesícula biliar.

Estadísticas

- Mujeres con tratamiento anticonceptivos orales.
- Personas con obesidad y colesterol.
- Personas con edad avanzada.
- Presencia de anemia hemolítica.

Síntomas

- Dolor en el hipocondrio derecho o en el epigastrio, ictericia y fiebre.

Signos

- Llenura abdominal, heces color arcilla, acidez estomacal y flatulencia.

Tratamiento

- Cirugía laparoscopia

Diagnostico

- Ecografía

COLECISTITIS

Inflamación de la vesícula biliar ocasionada por cálculos y con menor frecuencia por lodo biliar.

Síntomas y signos

- Signo de Murphy, masa en cuadrante superior derecho, nauseas, vomito, fiebre, resistencia muscular y dolor en cuadrante superior derecho.

Factores de riesgo

- Embarazo, obesidad, edad mayor a 40 años, sexo femenino, dislipidemia, diabetes.

Tratamiento

- Litotricia, narcóticos, antibióticos, AINES, colecistectomía, ácido ursodesoxilico.

CANCER DE VESICULA

Es un crecimiento anormal de células que comienza en la vesícula biliar.

Síntomas

- Dolor abdominal, hinchazón abdominal, pérdida de peso, ictericia en ojos y piel.

Factores de riesgo

- Sexo, edad, antecedentes de cálculos biliares, inflamación de los conductos biliares.

Pruebas de laboratorios

- Análisis de sangre, ecografía abdominal, tomografía computarizada, resonancia magnética, laparoscopia, biopsia, marcadores tumorales.