



Mi Universidad

NOMBRE DEL ALUMNO: IZARI YISEL PEREZ CASTRO

**TEMA: PROBLEMAS HEPÁTICOS Y PROBLEMAS
BILIARES**

PARCIAL: 2

MATERIA: PATOLOGÍA DEL ADULTO

**NOMBRE DEL PROFESOR: GUADALUPE CLOTOSINDA
ESCOBAR RAMIREZ**

LICENCIATURA: ENFERMERÍA

CUATRIMESTRE: 6ºA

PROBLEMAS HEPÁTICOS:
HEPATITIS. HEPÁTICA. CÁNCER DE HÍGADO

HEPATITIS

Concepto { Inflamación del hígado y cualquier persona puede contraer hepatitis.

HEPATITIS A

- Concepto { Inflamación del hígado debida a la infección por el virus de la hepatitis A
- Síntomas {
 - Niños A { Niños pequeños pueden no tener ninguno
 - Adulto { Heces de color claro, orina oscura, somnolencia, fiebre, náuseas, vómitos, pérdida del apetito e ictericia (ojos y piel amarillentos)
- Tratamiento { A menudo mejora en unas pocas semanas sin tratamiento. Descanse mucho y no beba alcohol
- Diagnostico { Muestra de sangre, generalmente, de una vena del brazo

Tipos más comunes son la hepatitis

HEPATITIS B

- Concepto { Puede contraer hepatitis B a través del contacto con la sangre, el semen u otros líquidos corporales de una persona infectada
- Síntomas {
 - Adulto { Generalmente no presenta síntomas, si lo tiene son como los de la hepatitis A, demora para que las hemorragias se detengan, inflamación del estómago o los tobillos, y tendencia a la formación de hematomas
 - Niños { Los lactantes, son más propensos a contraer hepatitis B crónica, que a menudo no presenta síntomas hasta que aparecen señales de daño hepático
- Tratamiento { Sin tratamiento, la hepatitis B crónica puede causar problemas hepáticos graves, la hepatitis B generalmente no se trata a menos que se vuelva crónica. Es importante saber si tienes la vacuna de la hepatitis B
- Diagnostico { Análisis de sangre, ecografía de hígado y biopsia de hígado

HEPATITIS C

- Concepto { Puede contraer hepatitis C de las mismas maneras que la hepatitis B, no hay vacuna contra la hepatitis C.
- Síntoma { Mayoría de las personas no presenta síntomas hasta que el virus ya causó daño hepático, lo que puede demorar 10 años o más. Otras personas presentan síntomas como los de la hepatitis A y B.
- Tratamiento { Medicamentos antivirales destinados a eliminar el virus del cuerpo
- Diagnostico { Análisis de sangre y pruebas para daños hepáticos

PROBLEMAS HEPÁTICOS:
HEPATITIS. CIRROSIS HEPÁTICA. CÁNCER DE HÍGADO

CIRROSIS HEPÁTICA

- Concepto { Cicatrización del hígado que da como resultado una función hepática anormal como consecuencia de una lesión hepática crónica (de largo plazo)
- Causa { Si bien el uso excesivo de alcohol y la infección crónica por virus de hepatitis (tales como la hepatitis B y la hepatitis C)
- Signos y síntoma { Pueden estar ausentes o no ser específicos en las primeras etapas síntomas inespecíficos iniciales tenemos la fatiga y el prurito. A medida que el tejido cicatricial reemplaza al tejido sano y empeora la función hepática, cansancio, sangrado y formación de hematomas con facilidad, pérdida del apetito, náuseas, hinchazón en las piernas, pérdida de peso, decoloración amarilla de la piel y los ojos, denominada ictericia, acumulación de líquidos en el abdomen, llamada ascitis.
- Diagnostico { Análisis de laboratorio, prueba de imagen y biopsia
- Tratamiento { Depende de su causa y de la medida del daño al hígado y los objetivos del tratamiento son de hacer más lenta la progresión del tejido cicatricial en el hígado y de prevenir o tratar los síntomas y las complicaciones de la cirrosis. Si el daño al hígado es grave, quizás necesites internarte en el hospital.

CÁNCER DEL HÍGADO

- Concepto { Segundo cáncer más común en el mundo, los virus de la hepatitis B y C a veces pueden causar cáncer, porque cambian el ADN de las células hepáticas, el código genético que da las instrucciones de reproducción a la célula cuando se apoderan de las células para multiplicarse
- Factor de riesgo { Los niños y adultos con infección crónica por hepatitis B, C o D (se necesita una infección por hepatitis B para contraer la hepatitis D)
- Tratamiento { Sin un tratamiento adecuado, cerca del 20% de los pacientes con cirrosis acabarán con cáncer de hígado. Los tratamientos para el cáncer de hígado primario dependen del avance (estadio) de la enfermedad, y también de tu edad, tu salud general y tus preferencias personales.
- Síntomas { Pueden ser parecidos a los de la cirrosis, entre ellos ictericia, fatiga, somnolencia y pérdida de peso. Con frecuencia los pacientes presentan dolor abdominal y masas abdominales. El cáncer del hígado también se puede propagar por el torrente sanguíneo, causando cáncer en otros tejidos y áreas del organismo. Si el cáncer es pequeño, a menudo es extirpado con cirugía.
- Diagnostico { Prueba de diagnóstico con imagen, análisis de sangre y extracción de una muestra de tejido hepático para análisis

COLELITIASIS.

Concepto { Presencia de litios (cálculos) en la vesícula biliar. Anomalías en la composición de la bilis, estasis de la bilis e inflamación de la vesícula biliar. La colelitiasis predispone la obstrucción del flujo biliar e induce cólico biliar y colecistitis aguda o crónica

Causa { Más frecuentes de enfermedad del árbol biliar son la colelitiasis y la colecistitis.

Cálculos { Los cálculos a nivel de la vesícula biliar se subdividen según su composición química, a saber: 75% colesterol, 25% pigmentos biliares.

Factores de riesgo { Los factores de riesgo bien definidos que se describen son edad, sexo femenino, obesidad, historia familiar.

Cuadro clínico { Cuadro clínico se caracteriza por ser inespecífico, ocasionalmente pueden presentar dolor en el hipocondrio derecho, intolerancia comida grasa, cólico biliar o colecistitis aguda y el manejo de la colelitiasis no complicada es expectante en algunos pacientes, colecistectomía.

PROBLEMAS BILIARES:
COLÉLITIASIS.
COLECISTITIS.
CÁNCER DE VESÍCULA

COLECISTITIS

Concepto { Inflación de la vesícula biliar ocasionada principalmente por cálculos y con menos frecuencia por barro biliar

Pacientes { En más del 40% de los pacientes ancianos puede no existir fiebre ni signos de irritación peritoneal.

Tratamiento { El tratamiento inicial consiste en mantener la dieta absoluta, reposición hidroelectrolítica y el uso de analgésicos y antibióticos para cubrir a enterobacterias (E. coli, Klebsiella) y enterococos y se recomienda amoxicilina clavulánico o piperacilina-tazobactam o el uso de cefotaxima.

Colecistitis crónica { Causada por ataques leves y repetitivos de colecistitis aguda que producen un engrosamiento de las paredes de la vesícula biliar y fibrosis de la misma, lo cual provoca finalmente la pérdida de su capacidad para concentrar y almacenar la bilis. La ingestión de alimentos grasos puede agravar los síntomas de colecistitis debido a la ausencia de la bilis para el proceso de la digestión de los alimentos.

CÁNCER DE VESÍCULA.

Concepto

Las neoplasias de la vía biliar son infrecuentes y se asocian a una alta mortalidad y mal pronóstico.

Tumore

De la vesícula biliar pueden clasificarse, según su aspecto macroscópico, en infiltrantes, papilares o nodulares, en función de la forma de crecimiento en el interior de la vesícula biliar

Síntomas

Los síntomas de presentación del CVB son poco específicos y difíciles de diferenciar desde el punto de vista clínico de otras patologías más prevalentes, como el cólico biliar o la colecistitis crónica, motivo por el que es difícil de sospechar de forma preoperatoria. El síntoma que se presenta con más frecuencia es el dolor que va a ser visceral, sordo, profundo, persistente, sin exacerbaciones y adscrito al hipocondrio derecho; estas características permiten diferenciarlo del dolor agudo, espasmódico y remitente del cólico biliar, ictericia y un síndrome tóxico para neoplásico bastante acusado.

c5eb7bdaa7a7049e425d41efbcf75b30-LC-LEN604