



**Mi Universidad**

## **RESUMEN**

**NOMBRE DEL ALUMNO:** Rosalba Mazariegos López

**TEMA:** conjuntivitis

**PARCIAL:** 4°

**MATERIA:** patología del adulto

**NOMBRE DEL PROFESOR:** Karla patricia Cabrera García

**LICENCIATURA:** enfermería

**CUATRIMESTRE:** 6°

Es toda afección conjuntival originada tanto por microorganismos infecciosos como por causas inflamatorias (alergias, toxinas, traumatismo, enfermedades sistémicas, etc.). las conjuntivitis bacterianas pueden tener diferente etiología siendo los gérmenes más frecuentes *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus pyogenes* y *Haemophilus influenzae*.

En las conjuntivitis bacterianas hiperagudas (purulentas) el germen más frecuente es *Neisseria gonorrhoeae*, que produce una conjuntivitis grave, en ocasiones bilateral.

Los síntomas pueden ser; Enrojecimiento de la parte blanca del ojo. Inflamación de la conjuntiva o de los párpados. Tener más cantidad de lágrimas. Sensación de tener un cuerpo extraño en el ojo o ganas de restregarse el ojo. Picazón, irritación o ardor y Secreciones.

Según la causa pueden producirse otros síntomas.

#### CONJUNTIVITIS VIRAL

Puede ocurrir con los síntomas del resfriado, la influenza (gripe) o de otra infección respiratoria. Por lo general, comienza en un ojo y puede pasarse al otro dentro de los pocos días. Las secreciones del ojo suelen ser acuosas en lugar de espesas.

#### 2. CONJUNTIVITIS BACTERIANA

Se asocia más comúnmente a secreciones (pus), que pueden hacer que los párpados se peguen. A veces, ocurre con una infección de oído.

#### 3. CONJUNTIVITIS ALÉRGICA

Generalmente afecta a ambos ojos. Puede producir picazón, inflamación y lagrimeo intensos de los ojos.

#### CONJUNTIVITIS CAUSADA POR IRRITANTES

Puede causar lagrimeo y secreciones mucosas.