

NOMBRE DEL ALUMNO:

Diana Jaxem Hernández Morales

NOMBRE DEL PROFESOR:

Rubén Eduardo Domínguez García

NOMBRE DEL TRABAJO:

Mapa conceptual

MATERIA:

Enfermería medica quirúrgica II


CUATRIMESTRE:


6°

GRUPO:

“A”

1.1. ANATOMIA Y FISIOLOGIA DE LA PIEL





ENFERMEDADES PAPULOESCAMOSAS

PSORIASIS

Es

Una enfermedad crónica, inflamatoria y proliferativa

La

Lesión más típica es una placa eritematosa de bordes netos, cubierta por escamas gruesas

Etiología

Factores exógenos

son

Traumatismos, la luz, Alteraciones endocrinas, factores metabólicos y fármacos

Factores genéticos

Por

Herencia familiar genes en la región HLA-C

Clínica

Psoriasis Vulgar

Son

Placas eritematoescamosas, bien delimitadas, pueden estar rodeadas de un halo claro

Psoriasis gutatta

Es

Casi exclusivo de niños y adultos jóvenes.

PARAPSORIASIS

En

1902 Brocq acuñó describió tres modalidades

Parapsoriasis en pequeñas placas

Clínica

Se da

Preferentemente en varones adultos

Son

Numerosas placas rojo-amarillentas, ovaladas, digitiformes o irregulares, de 2-5 cms

Asintomáticas, estables durante años.

Histología

Parapsoriasis en grandes placas

Clínica

Se

Caracteriza por grandes placas violáceas o parduzcas





Predomina en varones adultos.


Histología

Se

Aprecia atrofia epidérmica, infiltrado en banda superficial

TUMORES DE LA PIEL





CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA

CARCINOMA BASOCELULAR

MELANOMA

CARCINOMA ESPINOCELULAR

Carcinoma basocelular

Carcinoma espinocelular

Factores de riesgo

Responsable de un 80% de los casos.

Factores de riesgo

Exposición a radiación ultravioleta, edad avanzada

Es
El cáncer de piel más común, Se trata de una neoplasia con bajo potencial metastásico

Y de
Crecimiento lento, pero localmente invasiva y destructiva

Nodular

Morfeiforme

Superficial

Es la
Segunda neoplasia maligna de piel más común, tiene una tasa de mortalidad mayor que el CBC

con
Capacidad de producir metástasis a ganglios regionales u otros órganos.

Tiene
Un crecimiento rápido y aparece con frecuencia sobre lesiones precancerosas

Factores de riesgo

Quemaduras, lupus discoide, fístulas y osteomielitis

es la

Quinta forma de cáncer más común en EUA y la décima en México

Pues

Afecta más a mujeres y se presenta principalmente en extremidades inferiores

Se

Trata de la neoplasia maligna con mayor aumento en incidencia a nivel mundial

Es

Una neoplasia maligna derivada de melanocitos, células originarias de la cresta neural

Factores de riesgo

Son

Edades mayores a 50 años, historiales familiares de melanoma, presencia de

Y

Enfermedades asociadas a mutaciones genéticas y la exposición solar

Se divide en

Es el

son

Es la

con

Tiene

Es

Y de

Se

Es

Son

Y

es la

Pues

Se

Es

Son

Y