



Mi Universidad

MAPA CONCEPTUAL

NOMBRE DEL ALUMNO: Maritza Itzel López Luna.

TEMA: cuidados a pacientes con alteraciones de la piel, y alteraciones digestivas.


PARCIAL: I

MATERIA: Enfermería Médico Quirúrgico II.

NOMBRE DEL PROFESOR: Rubén Eduardo Domínguez García.

LICENCIATURA: Enfermería.

CUATRIMESTRE: 6



DERMATITIS



Es

Una enfermedad
inflamatoria común en la
piel.



También

La presentación clínica varía
con la edad, por lo que se
observan tres etapas las cuales
son: lactancia, infancia,
adolescencia o adultez.



Tratamiento

Deberá ser dirigido a prevenir la inflamación y disfunción de la barrera de la piel, así como al tratamiento oportuno de las infecciones. Una intervención temprana podría prevenir una mayor exposición y sensibilización a demás alérgenos en etapas posteriores de la vida.

ENFERMEDADES
PAPULOESCAMOSAS

Son

Trastornos cutáneos primarios,
Cuando las lesiones psoriásicas
conllevan artritis, debe
considerarse la posibilidad de
artritis psoriásica o artritis reactiva

También

Psoriasis es una enfermedad
crónica, inflamatoria y
proliferativa, genéticamente
determinada, con un gran
polimorfismo clínico.

Parapsoriasis para un grupo de
procesos cutáneos eritemato-papulo
escamosos de naturaleza desconocida
y evolución crónica.

TUMORES DE LA PIEL



Está conformado



Cáncer de la piel no melanoma ara un grupo de procesos cutáneos eritemato-papulo-escamosos de naturaleza desconocida y evolución crónica.

El carcinoma basocelular es el cáncer de piel más común: se calcula que anualmente hay 2.8 millones de casos nuevos en EUA; de ellos, un 95% de los casos ocurren entre los 40 y 79 años de edad; afecta más a hombres que mujeres.



También

Carcinoma espinocelular el CEC es la segunda neoplasia maligna de piel más común: comprende aproximadamente 20% de los casos; sin embargo, tiene una tasa de mortalidad mayor que el CBC.

ANATOMIA Y FISIOLOGIA
DEL SISTEMA DIGESTIVO



Está conformado por

Boca es la primera parte del tubo digestivo, aunque también se emplea para respirar.



Seguida por la

Faringe es un tubo que continua a la boca y constituye el extremo superior común de los tubos respiratorio y digestivo.



También

Esófago es el tubo que conduce el alimento desde la faringe al estómago.



Unido al

Estómago es una dilatación del tubo digestivo situada entre el esófago y el duodeno, con una capacidad aproximada de 1-1.5 litros.



Luego al

Intestino delgado es un tubo estrecho que se extiende desde el estómago hasta el colon, consta de 3 partes duodeno, yeyuno e íleon.




siguiente el

Intestino grueso se extiende desde la válvula íleo-cecal hasta el ano y tiene unos 1.5 m de longitud.



Con el

Páncreas es una glándula accesoria del tubo digestivo que está conectada al duodeno por dos conductos secretores, manteniendo con él una estrecha relación anatómica.



También

Hígado es el órgano de mayor importancia metabólica del cuerpo y el más grande, pesa 1.5 Kg aproximadamente.



Por ultimo

Sistema biliar es el sistema de canales y conductos que lleva la bilis hasta el intestino delgado.

ALTERACIONES DE
LA CAVIDAD ORAL



Conformado por

La xerostomía que se presenta en los ancianos no es fisiológica, sino, en general, manifestación de una enfermedad o efecto secundario de algún medicamento.



También

Estoma pirosis es la sensación urente de la mucosa oral, sin lesiones causantes aparentes.



Siguiente el

Aftas provenientes en la mayoría de los casos de infecciones virales, causan dolor, dificultad al movimiento de la lengua y de la cinética de la masticación; además, alteran la fonación y la deglución de manera secundaria.

ALTERACIONES
INTESTINALES

Conformado

La diarrea se caracteriza por la presencia de heces acuosas, poco compactas y frecuentes.

Se divide

también

Enfermedad intestinal inflamatoria enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa suelen conducir a síntomas con diarrea, sangre en las heces y dolor abdominal.

Estreñimiento consiste en la dificultad en evacuar las heces.

EI

Síndrome de mala absorción
Intolerancia a la lactosa, la enfermedad celíaca, fibrosis quística o intolerancia a la proteína de la leche de vaca.

Unido a

Síndrome del intestino irritable Forma crónica de molestia estomacal que empeora con el estrés y en la que suelen alternarse el estreñimiento y la diarrea.

También

Inmunodeficiencia
medicamentos que causen
diarrea