



**NOMBRE DEL ALUMNO:** Jessica Hernández Pérez

**TEMA:** (enfermedad del reflujo gastroesofágico),  
Gastritis, Cáncer del estómago,  
Colitis y Apendicitis Aguda...

**PARCIAL:** 1

**MATERIA:** Patología del Adulto

**NOMBRE DEL PROFESOR:** Guadalupe Clotosinda Escobar

**LICENCIATURA:** Enfermería

Unidad 1

Enfermedad del reflujo gastroesofágico

Se define como el paso del contenido gástrico al esófago de forma espontánea, en ausencia de algo que lo provoque.

Acidez y/o la regurgitación acida.

La acidez es una sensación de ardor, también conocida como pirosis, que se siente detrás del esternón, y aparece cuando el contenido gástrico pasa al esófago produciendo una irritación de la mucosa.

La regurgitación acida del pecho

Cuanto los fluidos gástricos ascienden, pudiendo llegar hasta la boca, Otros síntomas, los cuales son menos comunes, puede estar relacionados con esta patología.

Dolor de pecho, jadeos, dolor de garganta, afonía por irritación causada por el contenido ácido en la laringe, tos,

Gastritis y úlceras gástricas

**GASTRITIS:** Es la inflamación de la membrana que recubre el estómago, y dependiendo de si se mantiene o no en el tiempo (lo que depende de su causa y del tratamiento médico prescrito) puede presentarse de manera aguda o crónica.

Gastritis aguda

Tiende a estar producida por infecciones virales, bacterianas o parasitarias, incluso por el consumo de determinados medicamentos principalmente aquellos que son inflamatorios, consumo de bebidas alcohólicas.

Gastritis crónica

Causada por determinadas infecciones, consumo continuado y excesivo de bebidas alcohólicas, tabaco y posteriormente e por la anemia perniciosa.

**ULCERA GÁSTRICA:** Es conocida como ulcera péptica, causa clásicamente dolor quemante o retortijones, con frecuencia de aparición nocturna y se alivia de manera rápida con la ingestión de alimento o antiácidos.

Cáncer del estómago

El cáncer de estómago aparece como consecuencia de una proliferación anormal de células en cualquier parte del estómago y puede ser benigna o maligna, si se trata de afección maligna el 90% de los casos se deben al adenocarcinoma gástrico y suele surgir como consecuencia de una compleja interacción entre la infección por *Helicobacter pylori*, la propia predisposición genética y la alimentación, los síntomas iniciales suelen ser molestias abdominales en la zona del estómago, puede surgir o no náuseas y vómitos, malestar general pérdida de peso.

Se presenta en la parte superior del estómago. Una porción de la parte superior del estómago se adentra en el tórax.

Es una protuberancia alrededor del ombligo. Sucede cuando el musculo alrededor del ombligo no se cierra completamente después del nacimiento.

Es una protuberancia en la ingle. Este tipo es más común en los hombres, puede bajar hasta el escroto.

Colitis ulcerosa. Cáncer de colon. Ostomías.

Se divide

**COLITIS ULCEROSA:** Los pacientes con UC de larga evolución tienen mayor riesgo de presentar displasia epitelial del colon y carcinoma. Diversas características distinguen los cánceres de colon esporádicos de los asociados con colitis.

**OSTOMIAS:** Es una exteriorización del intestino en la pared del abdomen realizada con el objetivo de poder evacuar las heces debido a un problema médico que impida eliminarlas por el ano.

**CÁNCER DE COLON:** Se desarrollan a partir de adenomas de colon previos, y el cáncer colorrectal se puede evitar detectando y reseando los pólipos adenomatosos del colon. La detección de pólipos y de cánceres precoces asintomáticos se puede realizar analizando la presencia de sangre oculta en heces y por el examen directo de la mucosa.

Es una protuberancia en la parte superior del muslo, justo debajo de la ingle. Este tipo es más común en las mujeres que en los hombres.

Apendicitis Aguda

La incidencia máxima de la apendicitis aguda se presenta en el segundo y tercer decenios de la vida. Aunque puede ocurrir a cualquier edad, es relativamente rara en los dos extremos de la vida.

**PATOGENIA:** Desde hace mucho se tenía la idea de que el factor patógeno fundamental es la obstrucción de la luz. Sin embargo, dicha obstrucción se identifica sólo en 30 a 40% de los casos; en la mayoría, el acontecimiento inicial es la ulceración de la mucosa.

**HERNIAS:** Una hernia es un saco formado por el revestimiento de la cavidad abdominal (peritoneo). El saco pasa a través de un agujero o área débil en la capa fuerte de la pared abdominal que rodea el musculo, denominada fascia.

Tipos

**HERNIA FEMORAL:**

**HERNIA HIATAL:**

**HERNIA UMBILICAL:**

**HERNIA INGUINAL:**