



Mi Universidad

MAPA CONCEPTUAL

NOMBRE DEL ALUMNO: Maritza Itzel López Luna

TEMA: patologías digestivas.


PARCIAL: I


MATERIA: patología del adulto.

NOMBRE DEL PROFESOR: Guadalupe Escobar Ramírez

LICENCIATURA: Enfermería

CUATRIMESTRE: 6





COLITIS

Conformado por



Colitis ulcerosas

Cáncer de colon

Tiene

se desarrolla

Larga evolución tiene mayor riesgo de presentar displasia epitelial del colon y carcinoma.

A partir de adenomas de colon previos, y el cáncer colorrectal se puede evitar detectando y resecaando los pólipos adenomatosos del colon.

Características

Unido

En primer lugar, los esporádicos suelen ocurrir sobre un pólipo adenomatoso, mientras que los asociados a colitis se originan a partir de una displasia plana o una lesión o masa asociada a una displasia.

Ostomías Es una exteriorización del intestino en la pared del abdomen realizada con el objetivo de poder evacuar las heces debido a un problema médico que impida eliminarlas por el ano.


También

En segundo lugar, los cánceres de colon sincrónicos múltiples aparecen en 3 a 5% de los casos esporádicos, mientras que se producen en 12% de los asociados a colitis.



Unido a

En tercer lugar, la edad media de los individuos con cáncer esporádico se sitúa en el séptimo decenio, mientras que la de los pacientes con cáncer asociado a colitis lo hace en el cuarto decenio.



Por ultimo

En cuarto lugar, en el cáncer esporádico predomina la localización en el lado izquierdo, mientras que el asociado a colitis se distribuye de una manera más uniforme por todo el colon.

APENDICITIS AGUDA

Es

La inflamación aguda del apéndice vermiforme.

Síntomas

Dolor repentino que comienza en el lado derecho de la parte inferior del abdomen.

Dolor repentino que comienza alrededor del ombligo, y a menudo se desplaza hacia la parte inferior derecha del abdomen.

Dolor que empeore cuando toses, caminas o realizas otros movimientos bruscos.

Nauseas o vomito.

Incidencia

La incidencia máxima de la apendicitis aguda se presenta en el segundo y tercer decenios de la vida. Aunque puede ocurrir a cualquier edad, es relativamente rara en los dos extremos de la vida.