NOMBRE DEL ALUMNO: YESICA MICHEL LOPEZ MORALES

TEMA: HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL

PARCIAL: PRIMER PARCIAL

MATERIA: PRACTICA CLINICA DE ENFERMERIA I

NOMBRE DEL PROFESOR: ERVIN SILVESTRE

LICENCIATURA: ENFERMERIA

- HEMODIALIS Y DIALISIS PERITONEAL
  - La diálisis peritoneal implica la instalación de líquidos al espacio atreves de un catéter insertado quirúrgicamente y una hemodiálisis utiliza una máquina de diálisis y un dializador para limpiar la sangre
    - Diagnóstico de una infección asociadas a HD Y DP
      - Signos y síntomas
        - Puede haber infección sistémica asociada con fiebre escalofríos y rigidez, también puede presentar peritonitis con dolor abdominal fiebre y rigidez, también puede presentar infección en el sitio de acceso.
    - Riesgos de infección asociados
      - Hepatitis B
        - Se transmite por vía percutánea o sangre de pacientes infectados, a temperatura ambiente este se mantiene activo por siete días
      - Hepatitis c
        - Se transmite por exposición percutánea a la sangre infectada y más aumenta el riego en pacientes dializados, también su transmisión se da por material no esterilizado o desinfectados
      - Síndrome de inmunodeficiencia adquirida
        - se transmite atreves de sangre o fluidos o también por una desinfección inadecuada
      - Infección bacteriana
        - Pacientes en diálisis están en mayor riego de colonización de organismos multirresistentes, estos tipos de pacientes se aíslan.
      - Hongos
        - Los pacientes dializados son susceptibles a infecciones fúngicas causadas por microorganismos es importante llevar un estricto de precauciones
      - Mycobacteria
        - Se ha dado casos por mycobacteriana cuya fuente es de contaminación de agua utilizada en el proceso de diálisis
    - Principios básicos
      - Vigilancia
        - Checar a todos los pacientes crónicos de diálisis, registro d estatus de inmunización, vigilancia permanente y documentada de bacteriana
    - Medidas de prevención y control de infecciones
      - El personal de salud debe tener buena higiene en las manos, usar mascarilla y guantes, localizar limpiar el punto de acceso previo a la preparación de la piel
    - Precauciones estándar y basadas en vías de transmisión
      - Personal a cargo de paciente dializado debe tener precauciones estándar como lavado de mano, precauciones de contacto debido a los microorganismos.
    - Limpieza y desinfección ambiental
      - Todas las áreas donde circulan los pacientes deben estar en perfecta limpieza, debe haber procedimientos para prevenir la contaminación desechar suministro usados
    - Practicas seguras de medicación e inyección
      - Evitar la contaminación de frascos, usar jeringas estériles, los objetos punzantes deben desecharse en un contenedor especial.
    - Inmunización de pacientes, pruebas post-vacunación
      - Los pacientes dializados deben hacerse la prueba de VHB antes de comenzar el proceso, los pacientes menores de 65 deben recibir una dosis de vacuna neumococina
    - Educación a pacientes y personal
      - Los personales deben recibir capación inicial y sesiones periódicas, el paciente debe ser educado acerca del cuidado que ha de prestar al sitio de accesos o apósitos signos y síntomas de infección