

Mi Universidad

cuadro sinóptico

NOMBRE DEL ALUMNO: Rodolfo Román barrera López

TEMA: Patologías digestivas

PARCIAL: uno

MATERIA: Patologías del adulto

NOMBRE DEL PROFESOR: GUADALUPE CLOTOSINDA


ESCOBAR RAMIREZ

LICENCIATURA: Enfermería

CUATRIMESTRE: sexto

Patologías digestivas.

Enfermedades



Patologías Digestivas

Enfermedades

Colitis ulcerosa.

Los pacientes con mayor evolución tienen mayor riesgo de displasia epitelial del colon y carcinoma, de origen a partir de displasia plana o una lesión o masa asociada a una displasia.

Al igual, puede aparecer de 3 a 5% de casos esporádicos mientras que se produce en 12% en los asociados a colitis; la edad media de cáncer se sitúa en el séptimo decenio, con cáncer asociado a colitis lo hace en cuarto decenio

El cáncer esporádico, predomina su localización en lado izquierdo mientras el asociado a colitis se distribuye de manera uniforme por el colon; los cánceres mucinosos y anaplasicos son más asociados a colitis

Cáncer de colon.

Se desareola a partir de edemad de colon previos y cáncer colorrectal se puede evitar detectando y resecaando los polipos adenomatosos del colon para detectarlos en la sangre oculta en heces por el examen directo de las mucosas.

Estrategia: detención del sujeto asintomático en paciente con antecedentes familiares que han tenido enteropla inflamatoria, polipos colorrectal, polio edematosos o cáncer de primer o segundo grado

Ostomías: exteriorización del intestino en la pared del abdomen realidad con el objetivo de poder evaluar la heces debido a problemas médicos

Apendicitis aguda.

Se presenta en el segundo y tercer decenios de la vida, entre la pubertad y a los 25 años. La mayor afectación es para es en la lactancia y ancianos.

Hernia

Saco formado por el revestimiento de la cavidad abdominal rodeando el músculo de la falia y el tipo depende de la ubicación.

Hernia femoral: Es una protuberancia en la parte superior de muslo justo debajo de la ingle

Hernia Hlatal: parte superior de estómago se adentra en el torax

Hernia umbilical: protuberancia alrededor del ombligo sucede cuando después del nacimiento no cierra.

Hernia inguinal: protuberancia en la ingle y baja hasta el escroto.