



**Mi Universidad**

*Nombre del Alumno: Emilly Cruz Martínez*

*Nombre del tema: Cuadro Comparativo: Tipos de Tumores de Piel*

*Parcial: I Modulo*

*Nombre de la Materia: Enfermería Medico Quirúrgica II*

*Nombre del profesor: Cecilia de la Cruz Sánchez*

*Nombre de la Licenciatura: ENFERMERIA*

*Cuatrimestre: 6to CUATRIMESTRE*

# Tipos De Tumores De Piel

Carcinoma basocelular	Carcinoma espinocelular	Melanoma cutáneo	Queratosis seborreicas
<p>El carcinoma basocelular es el tumor cutáneo más frecuente, con cifras cercanas al 60% entre todos los cánceres de piel. En su etiopatogenia, el principal agente causal es la radiación ultravioleta acumulada; esto se fundamenta en los siguientes hechos: la localización preferente en cabeza y cuello, su predominio en foto tipos I-II, su predominio en individuos con profesiones al aire libre y la mayor frecuencia en pacientes que padecen síndromes genéticos con aumento de sensibilidad a los rayos ultravioleta. Otras posibles causas son las radiaciones ionizantes, determinados agentes químicos. La edad media de aparición se sitúa entre los 50 y los 60 años.</p>	<p>Los tumores de las células escamosas también se dan en áreas de la piel que han estado expuestas al sol, a menudo en la parte superior de la nariz, la frente, el labio inferior y las manos. También pueden aparecer en áreas de la piel que se han quemado, han estado expuestas a productos químicos o a radioterapia. Por lo general este cáncer aparece como un abultamiento rojizo y duro. A veces el tumor puede tener un aspecto escamoso, o puede sangrar o desarrollar una costra. Los tumores de células escamosas pueden diseminarse a los nódulos linfáticos en el área.</p>	<p>Es un tumor maligno derivado de los melanocitos. Representa el 3% de todas las neoplasias malignas de piel, es la causa del 65% de todas las muertes debidas a cáncer cutáneo y el 1% de todas las muertes por cáncer. Su incidencia aumenta aproximadamente entre un 4 y un 8% anual, hecho que, junto con el potencial letal de este tumor, lo ha convertido en un problema social y sanitario de primer orden. Los factores de riesgo principales son la latitud y exposición al sol, foto tipos bajos, antecedentes de melanoma familiar y presencia de nuevos.</p>	<p>Se las considera como los tumores epiteliales benignos más frecuentes. Se trata de una proliferación de queratinocitos basaloideos que se suele acompañar de hiperqueratosis e hiperpigmentación. Aunque algunos datos epidemiológicos se esgrimen a favor de la etiología genética y solar. Son muy frecuentes en personas de edad avanzada, hasta el punto de que es rara la persona de más de 50 años que no las presente. Se suelen localizar, además de en la cara, en el cuero cabelludo, el cuello y el tronco. Suelen presentarse, en un principio, como máculas marronáceas bien delimitadas que posteriormente se hacen elevadas, tomando un aspecto verrugoso y deslustrado.</p>
			