



NOMBRE DEL PROFESOR: SILVIA CELIA CANO MAZARIEGO

NOMBRE DEL ALUMNO (A): OLGA DELFINA CHABLE GARCIA

MATERIA: FARMACOLOGIA

SEMESTRE: 4TO CUATRIMESTRE

LICENCIATURA: ENFERMERIA

TEMA: MAPA CONCEPTUAL

FECHA:29/07/23

IECAS Y ARA II



SON FARMACOS UTILIZADOS HABITUALMENTE PARA EL TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL. ACTUAN BLOQUEANDO A DISTINTO NIVEL EL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA, UN MECANISMO QUE TIENE EL ORGANISMO PARA REGULAR DE FORMA PRECISA LA PRESIÓN ARTERIAL.

LOS IECAS
INHIBEN REVERSIBLEMENTE
LA ENZIMA CONVERTIDORA
DE ANGIOTENSINA



ANGIOTENSINA



IECA	ARA II
BENAZEPRIL	LOSARTAN
CAPTOPRIL	CANDESARTAN
TRANDOLAPRIL	TELMISARTAN



BETABLOQUEANTE	CALCIOANTAGONISTA
ACEBUTOLOL	AMLODIPINO
BISOPROLOL	FELODIPINO
NADOLOL	NICARDIPINO

BETABLOQUEADORES



ACTUAN INTERROMPIENDO LA ACCIÓN DE UNA SUSTANCIA NATURAL LLAMADA NORADRENALINA EN SITIOS ESPECIALES LLAMADOS ADRENORECEPTORES EN LAS ARTERIAS

VASODILATADORES:
-NITRODILATADORES
-AGONISTAS DE ATPASA K
-PROSTACICLINA Y DERIVADOS

-VASODILATADORES
-ALDOSTERONA
-ESTRÉS OXIDATIVO
-BRADIQUINAS (IECA LAS DEGRADA)

NO TODOS LOS ANTIHIPERTENSIVOS SON PARA HIPERTENSIÓN SISTEMÁTICAS

NO TODOS LOS VASODILATADORES SON ANTIHIPERTENSIVOS

ANTIHIPERTENSIVO EN EL EMBARAZO

CONJUNTO DE DESORDENES DE ORIGEN MULTISISTEMICO Y CAUSA DESCONOCIDA, ESTA RELACIONADO CUANDO OCURRE UN PROBLEMA DE IMPLANTACIÓN ANÓMALA, HIPOXIA/ISQUEMIA PLACENTARIA DISFUNCIÓN DEL ENDOTELIO MATERNO.

HIPERTENSIÓN ARTERIAL CRÓNICA:
PACIENTE CON TAS=140 PRESENTES ANTES DE LAS 20 SEMANAS DE GESTACIÓN

PRECLAMPSIA: SE DIAGNOSTICA DESPUES DE LAS 20 SEMANAS DE GESTACIÓN 140/90 MM HG

ECLAMPSIA: LA PRESENCIA DESPUES DE COVULSIONES ASOCIADAS A UN TRASNTORNO HIPERTENSIVO.



ANTIBIOTICOS

ES CUALQUIER SUSTANCIA QUIMICA PRODUCIDA POR UN MICROORGANISMO UTILIZADA PARA ELIMINAR EL CRECIMIENTO DE OTROS MICROORGANISMOS

PRINCIPALES GRUPOS

AMINOGLUCOCIDOS

ANFENICOLES

GLUCOPEPTIDOS

LINCOSAMIDAS

MACROLIDOS

