



ASIGNATURA: PATOLOGÍA DEL ADULTO

NOMBRE DE LA ACT: CUADRO SINÓPTICO

NOMBRE DEL ALUMNO: JOSE IGNACIO CHABLE ZACARIAS

NOMBRE DEL PROFESOR: GUADALUPE CRISTELL RIVERA ARIAS

GRADO: 6to

GRUPO: B

DISFUNCIÓN CARDÍACA

¿Qué es?

La insuficiencia cardíaca se produce cuando el músculo cardíaco no bombea sangre de la manera que debería.

Cuando esto sucede, la sangre a menudo retrocede y el líquido se puede acumular en los pulmones, lo que causa falta de aliento. Afecciones cardíacas progresivamente dejan el corazón demasiado débil o rígido como para llenarse y bombear sangre de forma apropiada.

Síntomas

Falta de aire durante una actividad o cuando estás acostado.
Fatiga y debilidad.
Hinchazón en las piernas, en los tobillos y en los pies.
Latidos del corazón rápidos o irregulares.
Menor capacidad para hacer ejercicio.

Causas

Si el corazón está dañado o debilitado, las cavidades cardíacas pueden estirarse y aumentar de tamaño. El corazón no puede bombear la cantidad de sangre necesaria.

Si las principales cavidades de bombeo del corazón, denominadas ventrículos, están rígidas, no pueden llenarse con suficiente sangre entre latidos.

Prevención

No fumes.
Haz mucho ejercicio.
Come alimentos saludables.
Mantén un peso saludable.
Reduce y controla el estrés.
Toma los medicamentos según lo indicado.

Factores de riesgo

Enfermedad de las arterias coronarias
Ataques cardíacos
Enfermedad de las válvulas cardíacas
Presión arterial alta
Latidos del corazón irregulares

Complicaciones

Daño o insuficiencia renal
Otros problemas cardíacos
Daño hepático
Muerte cardíaca súbita

Tratamiento

Diuréticos
Vasodilatadores
Morfina
Oxígeno terapia
Digoxina

PIELONEFRITIS

¿Qué es?

La pielonefritis aguda es una infección del tracto urinario que se origina en las vías urinarias y posteriormente sube al riñón - hasta uno de ellos o hasta ambos-. Es el tipo de infección más grave que puede afectar a las vías urinarias.

¿A quien afecta?

La pielonefritis aguda en su forma no complicada afecta sobre todo a mujeres sanas no gestantes, con un tracto genitorinario normal.

Causas

Habitualmente, la pielonefritis se produce porque los microorganismos presentes en el ano o en la vagina se propagan a la uretra, vejiga o uréter y ascienden hasta el riñón. La bacteria *Escherichia coli* - responsable de la cistitis- suele ser el agente infeccioso implicado en la mayoría de los casos.

Riesgos

Los cálculos renales, que pueden causar obstrucciones en las vías urinarias, las alteraciones anatómicas en estas, llevar una sonda vesical o una cirugía que haya afectado a las vías urinarias o tener una próstata grande también pueden provocar diferentes grados de obstrucción

Síntomas

Los síntomas más habituales de la pielonefritis son fiebre, dolor lumbar, malestar general, vómitos, náuseas y escalofríos. El paciente también puede presentar los síntomas propios de otras infecciones -cistitis, uretritis o prostatitis-, que han podido originar la infección del riñón.

Tratamiento

El tratamiento consiste en guardar reposo, ingerir líquido en cantidades adecuadas para facilitar la eliminación de las bacterias por medio de la orina, el alivio de la fiebre y el dolor con analgésicos y antipiréticos y la administración precoz de antibiótico.