



UNIVERSIDAD DEL SURESTE. PATOLOGIA DEL ADULTO.

CUADRO SINOPTICO.

URIEL GUSTAVO BAYONA CRUZ.

Apendicitis aguda y hernias

Apendicitis Aguda

¿Qué es? La apendicitis es una inflamación del apéndice, una bolsa en forma de dedo que se proyecta desde el colon en el lado inferior derecho del abdomen.

Causa La causa probable de la apendicitis es una obstrucción en el recubrimiento del apéndice que da como resultado una infección. Las bacterias se multiplican rápidamente y hacen que el apéndice se inflame, se hinche y se llene de pus. Si no se trata inmediatamente, el apéndice puede romperse.

Tratamiento El tratamiento de la apendicitis aguda es la apendicectomía abierta o laparoscópica.

- Síntomas**
- Dolor repentino que comienza en el lado derecho de la parte inferior del abdomen
 - Dolor repentino que comienza alrededor del ombligo
 - Dolor que empeora
 - Náuseas y vómitos
 - Pérdida de apetito
 - Fiebre ligera que puede empeorar
 - Estreñimiento o diarrea
 - Hinchazón abdominal
 - Flatulencia



Hernia

¿Qué es? Una hernia inguinal es cuando ocurre que una porción de tejido, como una parte del intestino, empuja hacia afuera a través de un lugar debilitado en los músculos abdominales.

- Causa**
- Aumento de la presión dentro del abdomen
 - Un punto débil preexistente en la pared abdominal
 - Esfuerzo al defecar u orinar
 - Actividades intensas
 - Embarazo
 - Tos o estornudos crónicos

- Síntomas**
- Un bulto en el área sobre cualquiera de los lados del pubis,
 - Una sensación de ardor o de dolor
 - Dolor o incomodidad en la ingle
 - Una sensación de pesadez o arrastre en la ingle
 - Debilidad o presión en la ingle

Tratamiento La cirugía es el único tratamiento con el que se puede reparar una hernia de manera permanente.



Infección urinaria

¿Qué es?

Una infección de las vías urinarias es una infección que se puede presentar en cualquier parte del sistema urinario. El sistema urinario comprende los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. La mayoría de las infecciones afectan las vías urinarias inferiores (la vejiga y la uretra).

Las mujeres tienen un mayor riesgo de contraer una infección de las vías urinarias que los hombres. Si una infección se limita a la vejiga, puede ser dolorosa y molesta. Sin embargo, pueden presentarse graves problemas de salud si una infección de las vías urinarias se extiende a los riñones.

Síntomas

- Una fuerte necesidad de orinar que no desaparece
- Una sensación de ardor al orinar
- Orinar frecuentemente en pequeñas cantidades
- Orina de aspecto turbio
- Orina de color rojo, rosa brillante o amarillado (signos de sangre en la orina)
- Orina con olor fuerte
- Dolor pélvico en las mujeres, especialmente en el centro de la pelvis y alrededor de la zona del hueso púbico

Tipos

Riñones

- Dolor de espalda o en el costado
- Fiebre alta
- Temblores y escalofríos
- Náuseas
- Vómitos



Vejiga

- Presión en la pelvis
- Molestias en la parte inferior del vientre
- Micciones frecuentes y dolorosas
- Sangre en la orina



Uretra

- Sensación de ardor al orinar
- Secreciones



Causa

La infección de las vías urinarias se produce, por lo general, cuando entran bacterias en las vías urinarias a través de la uretra y comienzan a propagarse en la vejiga. El sistema urinario está preparado para impedir la entrada de bacterias. Sin embargo, las defensas a veces no pueden impedirlo. Cuando esto se produce, las bacterias pueden proliferar hasta convertirse en una infección totalmente desarrollada en las vías urinarias.



Factores de riesgo

- Anatomía femenina
- Relaciones sexuales
- Determinados tipos de anticonceptivos
- Menopausia
- Problemas en las vías urinarias
- Obstrucciones de las vías urinarias