


En una enfermedad vascular cerebral, los síntomas más recurrentes son:

- Alteración repentina de la visión en un ojo o ambos
- Pérdida repentina de la fuerza en un brazo, una pierna o ambos
- Sensación de hormigueo en la cara, brazo o pierna
- Aparición repentina de: Problemas para hablar y/o entender lo que se escucha, acompañada por balbuceo
- Desequilibrio o inestabilidad
- Dolor de cabeza



Se dividen en:

- No modificables
  - La edad. Con los años el riesgo de presentar EVC aumentan
  - El sexo. Se presenta con mayor frecuencia en hombres que en mujeres
- Contribuyentes
  - Alcoholismo
  - Tabaquismo
  - Inactividad física
  - Obesidad
- Modificables o tratables
  - Presión arterial alta
  - Diabetes Mellitus
  - Niveles de colesterol elevados

El riesgo aumenta dependiendo del número de factores de riesgo que se presenten.

Esto te puede interesar

- GeriatrIMSS
- Presbicia
- Guías de cuidado del Adulto Mayor

En México, la enfermedad vascular cerebral ocurre en 118 personas por cada 100,00 habitantes al año.

La escala de Cincinnati

Esta escala consta de 3 parámetros

EL CONCEPTO ES

evalúa la presencia o ausencia de parálisis facial, la debilidad asimétrica del brazo y anomalías del habla en pacientes con posible enfermedad cerebrovascular..

EL CONCEPTO ES

La escala más utilizada para la valoración temprana es la escala de Cincinnati debido a su gran reproductibilidad y su alto nivel de predicción, en la que se valora e identifica a los pacientes que son candidatos a recibir una trombolisis.

Cada parámetro puede tener dos valoraciones, anormal o normal.

En la asimetría facial se considera normal que ambos lados de la cara se muevan de forma simétrica y como anormal que un lado de la cara no se mueve tan bien como el otro.

El habla se considera normal si el paciente utiliza palabras correctas, sin farfulla, y como anormal que el paciente al hablar arrastra las palabras, utilizando palabras incorrectas o no pueda hablar.