

HOJA DE PRESENTACIÓN

- Nombre De La Alumna: Lic. Reyna del Carmen Montero Felix.
- Escuela: UDS (Universidad Del Sureste).
 - Len- Licenciatura En Enfermeria.
 - Maestro: Juana Ines
 - Asignatura: Practicas profesionales
 - Grupo: LEN10SSC0520-A.
 - Fecha De Entrega: 11/07/2023
 - Numero de lista:



TIPOS DE ABORTOS

Aborto natural o espontaneo.

Es la perdida involuntaria antes de la semana 20 de gestación.

La mayoría de los abortos espontáneos ocurren debido a problemas cromosómicos que conllevan a un desarrollo anormal del feto.

Hay riesgo en la edad de 35 años, por tabaco o alcohol, obesidad, sedentarismo e historia clínica con anomalías.

Aborto inducido o provocado

Ocurre cuando la mujer decide poner fin a este embarazo de forma informada premeditada.

El misoprostol provoca que el útero se contraiga y se vacíe y esto demora de 3 a 5 horas.

Es el uso de medicamentos para terminar un embarazo no deseado.

Aborto por infección o séptico

Es una infección grave del útero que ocurre poco antes, durante o poco después de un aborto

Suele desarrollarse cuando el personal no entrenado utiliza técnicas no estériles.

Los abortos por infección incluyen fiebre, sangrado vaginal, cólicos un flujo vaginal fétido.

Aborto fallido o retenido.

Durante el embarazo las cosas no siempre resultan como se esperan, esto sucede antes de las 20 semanas queda en el interior de la cavidad uterina.

Las mujeres que experimentan un aborto diferido no suelen tener el sangrado o dolor típico de una perdida de embarazo.

La mayoría de las mujeres descubren que tuvieron un aborto retenido durante un chequeo regular.

TIPOS DE ABORTOS

Aborto terapéutico.

Es el aborto inducido justificado por razones medicas interrumpido voluntariamente de un embarazo antes de la viabilidad fetal.

Su causa es por que existe riesgo de enfermedad o un riesgo grave para la futura bebe.

No hay que confundir lo con el aborto indirecto que se produce cuando se lleva acabo una terapia necesaria.

Aborto legal

El aborto en México se encuentra despenalizado y cuando se cuente con el consentimiento de la mujer es de la voluntad de cada persona.

A excepción del aborto por una violación el poder legislativo de cada entidad federativa es autónomo.

Las entidades no pueden poner leyes que menoscaben los derechos sexuales y reproductivos de cada persona.

Aborto ilegal.

El aborto inseguro es la finalización del embarazo por personas que carecen de las habilidades necesarias o en un ambiente que carece de estándares.

Este tipo de aborto es una causa importante de mortalidad y morbilidad materna en el mundo.

La mayoría de los abortos inseguros ocurren en los países en desarrollo donde los médicos asequibles no están disponibles.

TIPOS DE ABORTOS

Aborto precoz.

Es un aborto prematuro en las 12 primeras semanas dentro este tipo de aborto incluyen aquellos llamados bioquímicos.

Uno de los síntomas mas frecuentes son el sangrado vaginal y el dolor en el hipogástrico.

En algunos casos tras el aborto natural algunos productos de la concepción permanecen en el útero.

Aborto tardío.

Este ocurre entre la semana 12 y 20 de embarazo con peso inferior a 500 gramos.

El primer paso en el DyC es dilatar el cuello uterino un día antes del procedimiento quirúrgico.

El siguiente paso es extraer el feto en este caso se puede aplicar anestesia local como general.

Aborto completo.

El cuello uterino cerrado después de la expulsión fuera del útero del feto y

Usualmente no necesitas un tratamiento adicional.

Se desprenden los tejidos y sale de útero y se considera un aborto completo.

TIPOS DE ABORTOS

Aborto incompleto.

Dilatación del cuello uterino y expulsión solo de una parte del contenido del útero.

Sucede cuando el embarazo no es expulsado y será necesario que se practique y un aborto en la clínica.

Hay sangrado o manchado vaginal dolor intenso en el abdomen y cólicos muy fuertes.

Aborto quirúrgico.

Es un conjunto de técnicas quirúrgicas que tiene el fin de provocar un aborto voluntario.

Este tipo de aborto dura en una clínica entre 10 y 20 minutos.

Pueden tener cólicos parecidos a los menstruales durante unos días o 2 semanas.