



*Nombre del Alumno: Esther Sthephany Zelaya Cerón*

*Nombre del tema: Trastorno Obsesivo Compulsivo, Relacionados Con Traumas, Factores De Estrés Y Disociativos. Trastorno De Ansiedad Y Somáticos.*

*Parcial: I ro*

*Nombre de la Materia: Psicopatología I*

*Nombre del profesor: Luis Angel Galindo Arguello*

*Nombre de la Licenciatura: Psicología*

*Cuatrimestre: 6to*



## TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO, RELACIONADOS CON TRAUMAS, FACTORES DE ESTRES Y DISOCIATIVOS Y TRASTORNO DE ANSIEDAD SOMETICOS



### TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO

El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) es una afección mental que consiste en presentar pensamientos (obsesiones) y rituales (compulsiones) una y otra vez. Estos interfieren con su vida, pero no puede controlarlos ni detenerlos.




### TRASTORNO DE ANSIEDAD POR SEPARACIÓN

Se encuentra asustada o ansiosa ante la separación de aquellas personas por las que siente apego en un grado que es inapropiado para el desarrollo.



Es importante destacar que las obsesiones no son placenteras ni se experimentan como voluntarias: son intrusivas y no deseadas, y causan malestar o ansiedad en la mayoría de los individuos.



Existe miedo o ansiedad persistente sobre los posibles daños que puedan sufrir las personas por las que siente apego y sobre las situaciones que puedan llevar a la pérdida o separación de las personas a quienes el sujeto está vinculado y rechazo a separarse de estas personas de mayor apego, así como pesadillas y síntomas físicos de angustia.

## TRASTORNO DISMÓRFICO CORPORA

## TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA



Es una enfermedad mental en el que no se puede dejar de pensar en uno o más defectos percibidos o defectos en la apariencia, un defecto que parece menor o que no puede ser visto por los demás. Pero puedes sentirte tan avergonzado, intimidado y ansioso que es posible que evites muchas situaciones sociales

Cuando tienes un trastorno dismórfico corporal, te enfocas intensamente en tu apariencia e imagen corporal, y revisas repetidamente el espejo, te aseas o buscas tranquilidad, algunas veces durante muchas horas al día.



Son una ansiedad persistente y excesiva y una preocupación sobre varios aspectos, como el trabajo y el rendimiento escolar, que la persona percibe difíciles de controlar

Es normal sentirse ansioso en algunos momentos, en especial, si tu vida es estresante. La ansiedad y la preocupación excesivas y continuas que son difíciles de controlar e interfieren en las actividades diarias pueden ser signo de un trastorno de ansiedad generalizada.



## TRASTORNO DE APEGO REACTIVO

Lactancia o la primera infancia se caracteriza por un patrón de conductas de apego notablemente alterado e inadecuado para el desarrollo, en el que el niño raramente recurre a una figura de apego para su comodidad, apoyo, protección y crianza.



## TRASTORNO DE SÍNTOMAS SOMÁTICOS

Se presenta cuando una persona siente una ansiedad extrema exagerada a causa de síntomas físicos. La persona tiene pensamientos, sensaciones y comportamientos tan intensos relacionados con los síntomas que siente que no puede hacer algunas de las actividades de su vida diaria.



## TRASTORNO DE APEGO REACTIVO



## FACTORES PSICOLÓGICOS QUE INFLUYEN EN OTRAS AFECCIONES MÉDICAS

Es una enfermedad poco frecuente, pero grave, en la cual un bebé o niño pequeño no establece vínculos saludables con los padres o las personas encargadas del cuidado. Este trastorno puede manifestarse si no se cumplen las necesidades básicas del niño en cuanto a comodidad, afecto y nutrición, y si no se establecen vínculos estables de cariño y cuidados con los demás.

Las actitudes y el comportamiento pueden empeorar un trastorno o un síntoma, dando lugar a una hospitalización o una visita a un servicio de urgencias. Por ejemplo, el estrés intenso puede debilitar temporalmente el corazón, o el estrés laboral crónico puede aumentar el riesgo de presión arterial alta (hipertensión).



## TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO



Es una afección de salud mental que algunas personas desarrollan tras experimentar o ver algún evento traumático. Este episodio puede poner en peligro la vida, como la guerra, un desastre natural, un accidente automovilístico o una agresión sexual. Pero a veces el evento no es necesariamente peligroso. Por ejemplo, la muerte repentina e inesperada de un ser querido también puede causar TEPT.

Estos factores pueden afectar negativamente al estado de salud porque influyen en su curso o en su tratamiento, constituyendo un factor de riesgo adicional establecido para la salud, o porque influyen en la fisiopatología subyacente, precipitando o exacerbando los síntomas o requiriendo atención médica.

Los factores psicológicos o de comportamiento son el malestar psicológico, los patrones de interacción interpersonal, los estilos de afrontamiento y los comportamientos desadaptativos para la salud, como la negación de los síntomas o la pobre adherencia a las recomendaciones médicas



## TRASTORNO DE IDENTIDAD DISOCIATIVA



## TRASTORNO FACTICIO

Conocido como trastorno de personalidad múltiple, la persona está bajo el control de dos identidades distintas de forma alternativa. Estas identidades pueden tener patrones de habla, de temperamento y de comportamiento diferentes de los que normalmente se asocian a la persona.

Además, la persona no puede recordar información que normalmente recordaba fácilmente, como los acontecimientos cotidianos, información personal importante y/o acontecimientos traumáticos o estresantes.

Es un trastorno mental grave en el cual una persona engaña a los demás haciéndose el enfermo, enfermándose a propósito o lastimándose a sí mismo





## AMNESIA DISOCIATIVA



Los métodos para falsificar la enfermedad pueden ser la exageración, la fabricación, la simulación y la inducción.

Es una incapacidad para recordar información importante autobiográfica que: 1) debe almacenarse con éxito en la memoria, y 2) normalmente sería recordada fácilmente. La amnesia disociativa se diferencia de las amnesias permanentes debido al daño neurobiológico o a la toxicidad que impiden el almacenamiento de memoria o la recuperación, ya que siempre es potencialmente reversible porque la memoria ha sido almacenada con éxito.

Aunque puede existir una afección médica preexistente, aparece un comportamiento engañoso o la inducción de lesiones asociadas con la simulación con la finalidad de que los demás les consideren (a ellos mismos o a otros) más enfermos o con mayor discapacidad, y esto puede dar lugar a una intervención clínica excesiva.



## TRASTORNO DE DESPERSONALIZACIÓN



Sucede cuando sientes en forma persistente o en repetidas oportunidades que te observas a ti mismo desde afuera de tu cuerpo, o sientes que las cosas que te rodean no son reales, o ambos.

Las sensaciones de despersonalización y desrealización pueden resultar perturbadoras y es posible que sientas que estás en un sueño.



# CONCLUSION

**LOS TRASTORNOS PSICOLÓGICOS RELACIONADOS CON TRAUMAS Y FACTORES ESTRESANTES SON CONSECUENCIA DE UNA EXPOSICIÓN A UN ACONTECIMIENTO TRAUMÁTICO O ESTRESANTE. LA DEPRESIÓN Y LA ANSIEDAD A MENUDO SON DESTACADAS, LAS PERSONAS CON TRASTORNOS RELACIONADOS CON UN EVENTO TRAUMÁTICO A MENUDO PRESENTAN UNA GRAN VARIEDAD DE SÍNTOMAS QUE PUEDEN NO ESTAR CLARAMENTE RELACIONADOS CON EL PROPIO EVENTO TRAUMÁTICO. POR EJEMPLO, LA PERSONA AFECTADA PUEDE ACTUAR DE FORMA AGRESIVA, SER INCAPAZ DE EXPERIMENTAR PLACER Y/O SENTIRSE INQUIETA, DESCONTENTA, ENOJADA, ADORMECIDA O DESCONECTADA DE SÍ MISMA O DE LOS DEMÁS. LOS TRASTORNOS PSICOLÓGICOS Y CONDUCTUALES DE LA EA DEBEN TRATARSE SIEMPRE TENIENDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE CADA PACIENTE Y VIGILANDO ESTRECHAMENTE LA APARICIÓN DE EFECTOS SECUNDARIOS INDESEABLES.**

# BIBLIOGRAFIA

**LIBRO: UDSMIUNIVERSIDAD.COM**

**[HTTPS://MEDLINEPLUS.GOV/SPANISH/OBSESSIVECOMPULSIVEDISORDER.HTML](https://medlineplus.gov/spanish/obsessivecompulsivedisorder.html)**

**[HTTPS://WWW.MAYOCLINIC.ORG/ES-ES/DISEASES-CONDITIONS/BODY-DYSMORPHIC-DISORDER/SYMPTOMS-CAUSES/SYC-20353938](https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/body-dysmorphic-disorder/symptoms-causes/syc-20353938)**

**[HTTPS://WWW.MAYOCLINIC.ORG/ES-ES/DISEASES-CONDITIONS/REACTIVE-ATTACHMENT-DISORDER/SYMPTOMS-CAUSES/SYC-20352939](https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/reactive-attachment-disorder/symptoms-causes/syc-20352939)**

**[HTTPS://MEDLINEPLUS.GOV/SPANISH/POSTTRAUMATICSTRESSDISORDER.HTML](https://medlineplus.gov/spanish/posttraumaticstressdisorder.html)**

**[HTTPS://WWW.MSDMANUALS.COM/ES-MX/HOGAR/TRASTORNOS-DE-LA-SALUD-MENTAL/TRASTORNOS-DISOCIATIVOS/TRASTORNO-DE-IDENTIDAD-DISOCIATIVO](https://www.msmanuals.com/es-mx/hogar/trastornos-de-la-salud-mental/trastornos-disociativos/trastorno-de-identidad-disociativo)**

**[HTTPS://WWW.MAYOCLINIC.ORG/ES-ES/DISEASES-CONDITIONS/DEPERSONALIZATION-DEREALIZATION-DISORDER/SYMPTOMS-CAUSES/SYC-20352911](https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/depersonalization-derealization-disorder/symptoms-causes/syc-20352911)**

**[HTTPS://MEDLINEPLUS.GOV/SPANISH/ENCY/ARTICLE/000955.HTM#:~:TEXT=EL%20TRASTORNO%20DE%20SOM%C3%ADNTOMAS%20SOM%C3%A1TICOS,ACTIVIDADES%20DE%20SU%20VIDA%20DIARIA.](https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000955.htm#:~:text=EL%20TRASTORNO%20DE%20SOM%C3%ADNTOMAS%20SOM%C3%A1TICOS,ACTIVIDADES%20DE%20SU%20VIDA%20DIARIA.)**

**[HTTPS://WWW.MSDMANUALS.COM/ES-MX/HOGAR/TRASTORNOS-DE-LA-SALUD-MENTAL/TRASTORNOS-SOM%C3%A1TICOS-Y-TRASTORNOS-RELACIONADOS/FACTORES-PSICOL%C3%B3GICOS-QUE-AFECTAN-A-OTRAS-ENFERMEDADES#:~:TEXT=LAS%20ACTITUDES%20Y%20EL%20COMPORTAMIENTO,PRESI%C3%B3N%20ARTERIAL%20ALTA%20\(HIPERTENSI%C3%B3N\).](https://www.msmanuals.com/es-mx/hogar/trastornos-de-la-salud-mental/trastornos-som%C3%A1ticos-y-trastornos-relacionados/factores-psicol%C3%B3gicos-que-afectan-a-otras-enfermedades#:~:text=LAS%20ACTITUDES%20Y%20EL%20COMPORTAMIENTO,PRESI%C3%B3N%20ARTERIAL%20ALTA%20(HIPERTENSI%C3%B3N).)**