



Nombre de la alumna: MEYLIN DEL ROCIO  
VELAZQUEZ RODRIGUEZ.

Docente: MARIA CECILIA ZAMORANO  
RODRIGUEZ.

Actividad: CUADRO SINOPTICO

Materia: PRACTICA CLINICA DE ENFERMERIA I

Cuatrimestre: 6TO

Grupo: A.

**Venoclisis** } Es la administración de fármacos diluidos por vía endovenosa mediante un sistema de gota continuo o intermitente.

**Infusión Intermitente** } El medicamento será diluido en una pequeña cantidad de sol. fisio } Transfusión de 30 minutos o más.

**Infusión Continua** } El medicamento es administrado en mayor tiempo } Mayor de 12 horas.

**Boto endovenoso** } Dosis relativamente alta en un corto espacio de tiempo } De 1-30 minutos.

**Indicaciones**


- Administración de tratamiento farmacológico
- Reanimación de shock
- Hidratación
- Transfusión de hemoderivados
- Precolectiva de CVP.

**Materiales**

- Pinza
- Campo estéril
- Torundas
- Jeringas
- Sol. fisiológica
- Catéter de varios calibres
- Tapa de triple vía con extensión
- Tegaderm
- Guantes
- Ligadura

**Instalación de Catéter Venoso Periférico**

1. Lavado de manos clínica.
2. Colocar guantes y elegir vena.
3. Limpiar sitio de punción y ligar el brazo.
4. con la mano dominante insertar la aguja en la vena elegida.
5. Una vez canalizado retirar ligadura.
6. Conectar línea de 3 vías con la extensión.
7. Fijar con tegaderm.
8. Escribir fecha y quien instaló.
9. Administrar tratamiento indicado.
10. Lavado de manos clínica.



## Bibliografía

UDS. (07 de 07 de 2023). Obtenido de

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LEN/64552b391767f4bc8f3cb41701dcf5a6-LC-LEN601%20PRACTICA%20CLINICA%20DE%20ENFERMERIA%20I.pdf>